



Joseph Jakob Plenck,


der Wundarzneykunst Doktors, der Chemie und Pflanzenkunde  
öffentlichen ordentlichen Lehrers in der k. k. medizinisch - chi-  
rurgischen Josephinischen Akademie, eben derselben bestän-  
digen Sekretärs, Direktors der Feldapotheken und  
Feldstabschirurgus.

L e h r e

von den

v e n e r i s c h e n

K r a n k h e i t e n.



Aus dem

Lateinischen überseht.

---

Zweite verbesserte Auflage.

---

W i e n,

bey Rudolph Gräffer und Compagnie 1787.





---

## V o r b e r i c h t.

**A**llen, die sich mit der Heilung der Krankheiten beschäftigen, ist es aus der Erfahrung bekannt, daß sich nicht nur in volkreichen Städten, sondern auch auf dem platten Lande keine Krankheit gewöhnlicher einfindet, als die Lustseuche. Man kann daher diese allgemeine Krankheit sehr passend eine immer wählrende, und im Verborgenen umher schleichende Pest nennen, durch die sehr oft die vortrefflichsten Personen schon in der Blüthe der Jugend zum Nachtheile des gemeinen Wesens dahin gerissen, oder so sehr verstümmelt werden, daß sie zu den Geschäften größtentheils untüchtig sind. Weil auch die wahre Pest nur selten, die venerische aber immer fort wüthet; so glaube ich mit Herrn Mead ganz sicher, daß das menschliche Geschlecht durch dieses Gift schon lange aufgerieben seyn würde; wenn nicht seine erste Wuth von sich selbst nachgelassen hätte, und durch ein entdecktes Gegengift gebän-

## V o r b e r i c h t.

diget worden wäre. Denn dieses schreckliche Uebel hat mit den übrigen ansteckenden Krankheiten dieses gemein, daß eine einzige unreine Weibsperson hinreichend ist, viele Familien, Dörfer, und Gemeinden anzustecken: dieß findet man durch viele Beispiele von venerischen Säugammen in den Schriften der Beobachter bewiesen.

Ueberdieß wird es nicht selten auf die späte Nachkommenschaft fortgepflanzt, und verursacht ganz verschiedene verlarvte Krankheiten, deren Erkenntniß und Heilungsart die Aerzte sehr oft irre führt. Ueber dieß stiftet diese Seuche kaum einen größern Schaden, als die verkehrte widersinnige Heilungsart derselben; denn ein jeder Dummkopf, ein jeder Bartscherer, ein jedes altes Weib nimmt die Kur solcher Krankheiten heimlich auf sich; weil sich solche elende Kranke, ihrer Ausschweifungen wohl bewußt, unzeitig scheuen, einem rechtschaffenen Arzte oder Wundarzte ihre Umstände zu entdecken.

Wegen dieser Ursachen pflegte ich jährlich in meinen Vorlesungen die Abhandlung von den venerischen Krankheiten, die ich nun der Presse über-



## V o r b e r i c h t.

übergebe, meinen Zuhörern vorzutragen. Die im Jahre 1766 von mir bekannt gemachte Methode, die Lustseuche mit dem gummigten Quecksilber zu heilen, empfehle ich noch immer; nicht, um auf den Namen eines Erfinders stolz seyn, oder andern berühmten Männern widersprechen zu können; welche Thorheit, und Undank von mir weit entfernt sind: sondern, weil mich eine zwanzigjährige zahlreiche und glückliche Erfahrung dieses Gesändniß machen heißt, und weil ich mit diesem Arzneymittel Personen geheilet habe, bey denen andere Quecksilberzubereitungen langsam wirkten, und entweder gefährlich wurden, oder wohl gar unwirksam blieben. Ueberdieß sehe ich die Thätigkeit des Gummi-Quecksilbers durch die Versuche bestätigt, welche berühmte Männer auch in andern Ländern, z. B. in England, \*) Frankreich, \*\*) Schweden \*\*\*) u. s. w. damit unternommen haben.

A 3

Da

\*) *A new and easy method of giving mercury by I. Plenck — translated from the latin by W. Saunders. 3. Edit. Lond. 1772.*

\*\*) *Méthode nouvelle d'administrer le vis-argent, — ouvrage traduit du latin de M. Plenck par M. Laflice, à Nancy.*

\*\*\*) *Abhandlung der kön. Schwedischen Akademie 32. Band, 291. S. Odhelius Versuche mit Mercurio gummoso.*

## V o r b e r i c h t.

Da ich den Mohnsaft zur Heilung der Lustseuche nach den Versuchen des berühmten Michaelis sehr wirksam gefunden habe, so pflege ich schon seit zwey Jahren diesen innerlich und äusserlich mit den gummigten Quecksilber zu verbinden.

Ich überlasse es dem Ausspruche des Publicums, was ich bey diesem Werkchen, ausserdem daß es einen bequemen Leitfaden zu akademischen Vorlesungen abgiebt, etwa noch für Verdienste haben möge.







# Inhalt.

Von den venerischen Krankheiten überhaupt.

---

## Krankheiten des männlichen Glieds.

- Tripper. 31  
Harnbrennen. 42  
Harnhemmung. 44  
Kry stallbläschen. 49  
Röd'tchen des männlichen Glieds. 49  
Geschwüre der Eichel. 50  
Krebs der Eichel.  
Geschwüre der Harnröhre.  
Geschwulst der Vorhaut.  
Entzündungsgeschwulst der Vorhaut.  
Steifheit des männlichen Glieds.  
Wollustkrampf des männlichen Glieds.  
Krümmung des männlichen Glieds.  
Männliches Unvermögen.

## Krankheiten der Hoden.

- Entzündung der Hoden.  
Verhärtung der Hoden.  
Geschwüre des Hodensackes.

## Krankheiten der Vorstehedrüse.

Entzündung der Vorstehedrüse.

Eiterbeule — — —

Verhärtung — — —

## Krankheiten des Mittelfleisches und des Afters.

Fistel des Mittelfleisches.

— — Afters.

Afterkrampf.

Feigwarzen.

## Krankheiten der Schamweichen.

Luftseuchbeulen.

Verhärtete Fettgeschwülste.

## Hautkrankheiten.

Flecke.

Krähe.

Hautschunden.

Venerische Eiterbeulen.

Flechte.

Gründ.

Haarausfall.

Verderbniß der Nägel.

Jucken.

Ausatz.

Geschwüre.

Augen:



## Augenkrankheiten.

Augenentzündung.

Augentriefen.

Flecke der Hornhaut.

Geschwüre der Hornhaut.

Eiterauge.

Thränenfistel.

Gerstenkorn.

Staar.

Schwarzer Staar.

## Ohrenkrankheiten.

Taubheit.

Ohrentriefen.

## Nasentkrankheiten.

Nasentriefen.

Nasengeschwüre. *p. 114*

Ungestaltlichkeit der Nase. *116*

Mißlaut der Stimme. *118*

## Mundkrankheiten.

Schwämmchen. *118*

Geschwüre des Gaumens. *120*

Krähe am Rinn. *121*

## Krankheiten des Halses, und der Kehle.

Kropfgeschwülste.

Bräune.

A 5

Bno=

## Knochenkrankheiten.

Knochenbeule.

Knochengeschwulst.

Knochenzerfressung.

Winddorn.

Knochenerweichung.

Knochenzerbrechlichkeit.

## Gliederkrankheiten.

Gliedergeschwülste.

Gliedersteifheit.

## Venerische Krankheiten der Frauenzimmer.

### Krankheiten der Geburtsglieder.

Weisser Fluß.

Entzündung der Geburtstheile.

Verhärtung der Geburtstheile.

Geschwüre der Schaam.

— — — Gebärmutterseide.

### Gebärmutterkrankheiten.

Venerische Hemmung der monatlichen Reinigung.

Verschwürung der Gebärmutter.

Luftgeschwulst der Gebärmutter.

### Krankheiten der Brüste.

Entzündung der Brüste.

Geschwüre der Brüste.

Krebsgeschwüre der Brüste.

Inner.



Innerliche venerische Krankheiten.

Venerische Fieber.

Einfaches venerisches Fieber.

Venerisches Ausschlagsfieber.

Entzündungsartiges v. F.

Schleichendes v. F.

Galligtes v. F.

Venerisches Wechselfieber.

Brämpfe.

Steiffucht.

Fallsucht.

Entkräftungen.

Venerische Mattigkeit.

— — Lähmung der untern Gliedmassen.

Venerischer Halbschlag.

Schmerzen.

Hauptschmerz.

Schlafmangel.

Brustschmerz.

Darmschmerz.

Gliederfucht.

Rheumatismus.

Hüftschmerz.

Knochenschmerz.

## Venerische Krankheiten der Werkzeuge des Athemholens.

Beschwerliches Athmen.

Husten.

Heiserkeit.

### Flüsse.

Speichelfluß.

Afterzwang.

Eiterfluß aus dem After.

Eiterharnen.

### Auszebrungen.

Vertrocknung.

Einfache Schwindsucht.

Schwindsucht mit Eiterauswürfe.

### Anhang.

Von der Lustseuche der Schwangern.

— — — — — Kinder.

Von der verborgenen Lustseuche.

— — verlarvten — —

— — mit andern Krankheiten vereinigten Lustseuche.

— — Verhütung der Lustseuche.

Formeln der Arzneyen.







Von den  
Venerischen Krankheiten  
überhaupt.

**K**rankheiten, die vom venerischen Gifte entstehen,  
werden venerische Krankheiten genannt.

Dieses Gift wurde am ersten durch die Flotte des  
Christoph Kolumb's im J. 1493 aus den amerika-  
nischen Inseln nach Europa gebracht. \*)

Hier:

---

\*) Es sagen zwar mehrere Schriftsteller, z. B. Becker und Sanchez, die Lustseuche wäre in Italien und Frankreich schon lange vor der Rückreise Kolumbo's aus Amerika zugegen gewesen. Weidmann will das nämliche von Deutschland behaupten. Indessen haben die  
Schrift

Hierauf wurde es bey der Belagerung Neapels so sehr verbreitet, daß es die belagernden die französische, die Belagerten die neapolitanische, und diejenigen, welche dieses neue Ubel aus Amerika nach Hispanis brachten, die spanische Krankheit nannten. \*)

Das venerische Gift scheint eine Ausartung der in Amerika unter dem Namen Yaws bekannten, und in den Antillen hauptsächlich endemischen Krankheit zu seyn.

Die-

Schriftsteller des 14ten und 15ten Jahrhunderts nur von den Krankheiten und den Geschwüren des männlichen Glieds geschrieben, welche üppige Mannspersonen durch den Veyrschlaf mit aussägigen, oder mit irgend einem andern unreinen Gebrechen angesteckten Fräuzchennern angeerbt hatten. Denn diese Krankheiten waren örtlich (topica,) arteten nie in eine Lustseuche aus, und wurden ohne Quecksilber geheilet. Die Folgen der wahren Lustseuche waren so schrecklich, daß sie wohl gewiß der Kenntniß so vieler Aerzte, die vor Kolumbo's Rückreise schrieben, nicht entwischt, oder ohne Namen geblieben seyn würden, wenn sie vor diesem Zeitpunkte in Europa grassirt hätte. S. Astruc de morbis venereis. T. 2.

\*) Andere nennen diese Krankheit auch *Siphylis*, vom *Siphylus*, dem Hirten des Königs Alcithous, der, auf die Menge, und Schönheit seiner Heerden stolz, der Sonne Troß bot; die aber, wie die Dichter sagen, die Hoffart desselben zu bestrafen, dieß schreckliche Ubel auf die Welt schickte. S. Freyh. van Swieten Comment. T. V. p. 372. der Leidner Ausgabe.



Diese Krankheit ist durch ein fremdes Klima bössartiger gemacht worden; so wie auch ißt die Lustseuche um so schlimmer ist, je mehr ein Land gegen Norden gelegen ist. \*)

Dies

- \*) Noch unlängst glaubte der Herr von Zaller, *Biblioth. med. pract. T. I. p. 474.* unsere Lustseuche wäre ein Abkömmling der amerikanischen Yaws. Weil letztere Krankheit durch den Besschlaf und das Stillen der Kinder fortgepflanzt, und durchs Quecksilber geheilt wird; so denke ich, man könnte das Entstehen unserer Lustseuche von dem amerikanischen Yaws ganz gut herleiten: ungeachtet es Schriftsteller giebt, welche glauben, dieselben wären keine venerische Krankheit, weil sie bey uns nicht entstünden. Aber die Lustseuche verursachte bey ihrem ersten Ursprunge Beulen über den ganzen Körper; und ich sah einen Bauer, der fast am ganzen Körper, und auch zwischen den Zehen und am Angesichte Feigwärzen hatte; welche Auswüchse dem Yaws am nächsten zu kommen scheinen. Nimmt man dieß an, so folgt wohl von sich selbst, daß, gleichwie die Saamen der nämlichen Pflanze nach der Verschiedenheit des Klima's, des Grundes, und der Kultur sehr verschiedene Blätter, Blüthen und Früchte tragen; eben also auch das Yawsmiasma in unserm Klima durch den wiederholten Besschlaf und verschiedene angewandte Arzneymittel andere Krankheiten habe erzeugen können. Das Entstehen der Yaws leitet Herr Schillig, *Diatribes de morbo in Europa pene ignoto; quem Americani vocant Yaws, p. 9. §. 73.* von dem Genuße der Frucht des Musabaums her, dessen man sich in denselben Gegenden anstatt des Brodes bedient.

Das Entstehen der Lustseuche leiten Einige von dem zügellosen Besschlaf mit Gemeinhuren, andere vom  
Bey.

Diese neue Seuche war bey ihrem Anfange weit bössartiger ; denn sie steckte immer den ganzen Körper mit sehr schlimmen Geschwüren und Beulen an. Mit der Zeit ließ ihre Wuth von sich selbst nach.

Die Eigenschaften dieses ansteckenden Giftes sind von allen bis ißt bekannt gewordenen Schärfen, und ansteckenden Materien verschieden. Folglich ist es ein besonderes Miasma. Es ist aber

1) sehr fein ; denn es dringt durch die kleinsten Gefäße, und Dunstlöcherchen unsers Körpers ein.

2) Festsetzend oder fix ; denn man weiß noch durch keine Erfahrung, daß Jemand durch die bloße  
Aus-

Beyschlase mit Ausfägigen, andere vom Einflusse der Sterne, andere von der durch häufigen Regen verdorbenen Luft, andere von einem Fehler in der Leber, andere von der Bössartigkeit des Wassers, andere vom Trinken des Weins, den die Spanier vorher mit dem Blute der Ausfägigen verunreiniget hatten, andere vom Genuße des Menschenfleisches, andere von der Vermischung eines Menschen mit einem Pferde, andere vom Stiche, oder von der Verspeisung einer gewissen amerikanischen Schlange, s. *Gruner morbor. antiquitates* p. 80. 81. andere von einer Strafe Gottes für die Venusritter her : allein diese hätten anmerken sollen, daß sehr oft unschuldige Kinder, Ehefrauen, oder Säugammen ohne alles Vergehen von dieser Seuche angesteckt werden. Senflers Geschichte der Lustseuche die zu Ende des XV. Jahrhunderts in Europa ausbrach. I. B. 783.



Ausbünstung, ohne Berührung des Miasmas angesteckt worden wäre.

3) Scharf, entzündend; denn es erzeugt durch den Reiz schleichende Entzündungen, ähnliche Geschwülste, und eine phlogistische Verdickung der Säfte.

4) Mit schleimigten und öligten Säften hat es eine Verwandtschaft. Daher greift es oft die Schleimdrüsen, und die Knochen an.

5) Es ist weder sauer, \*) noch laugensalzig, noch faulartig, noch salzig.

6) Bey der Nacht wüthet es gemeiniglich ärger.

7) Es kann nur durchs Quecksilber geheilet werden.

8)

---

\*) Einige glauben das Lustseuchemiasma wäre sauer, weil die venerische Jauche die Knochen weich, die blauen Säfte der Gewächse roth macht, und durch Laugensalze, und das Quecksilber geheilt wird, welches, nach ihrem Ausspruche das Sauere absorbirt. S. Cezan *Manuel antisypilitique, ou Essai sur les maladies veneriennes. Paris 1774. p. 205.* Es ist aber noch nicht sicher erwiesen, daß die Seuche durch Laugensalze geheilet wird. Wie sollte überdieß der mit dem Salzsäuren so reichlich versehene ägende Quecksilbersublimat das venerische Sauere absorbiren?

8) Es entsteht nie in unserm Körper, sondern wird immer in demselben hinein gebracht. \*)

Die Art der Ansteckung, durch die dieses Gift in den Körper zu kommen pflegt, ist vierfach:

1) Durch die Erzeugung von einer venerischen Mutter, die durch ihr Blut der Frucht das Gift mittheilt. Ob aber ein Vater, dessen Saame venerisch ist, ein venerisches Kind, ohne Ansteckung der Mutter erzeugen könne, ist noch zweifelhaft.

2) Durchs Stillen. Also werden öfters gesunde Kinder von einer venerischen Säugamme, und gesunde Ammen von venerischen Kindern angesteckt \*\*)

3)

\*) Die sogenannte unmittelbare (*extemporanea*) Lustseuche, die ohne einen unreinen Beyschlaf von sich selbst, dem Vorgeben nach, entstehen soll, die auch einige Schriftsteller selbst gesehen zu haben vorgeben, halte ich für keine wahre Lustseuche, sondern für ein von sich selbst entstandenes Verderbniß des Schleimes der Harnröhre, oder für eine vorhin verborgene, und durch den Beyschlaf, oder irgend eine andere hinzugekommene Ursache nun bloß entwickelte Lustseuche.

\*\*) Hieher gehört auch die Ansteckung durch die Weibspersonen, von denen sich Kindbetterinnen die Brüste ausfaugen lassen. S. Blancard, *Belagerte*, und entsetzte *Venus*, S. 477. — *Medizinische Vers. und Bemerkungen einer Gesellschaft in Edimb.* 3. B. 444. S. — Der Arzt,  
eine

3) Durch den Bey Schlaf eines gesunden Mannes mit einer mit dem venerischen weissen Flusse behafteten Weibsperson ; oder eines gesunden Frauenzimmers mit einem Manne , der am venerischen Tripper leidet. Diese Ansteckung kommt am gewöhnlichsten vor. Unter 100 Angesteckten haben gewiß 99 aus dieser Ursache die Seuche bekommen.

4) Durch die Berührung der venerischen Tauche , hauptsächlich , wenn der berührende Theil verwundet , oder nur mit einem feinen Oberhäutchen bedeckt ist. Also hat man Bemerkungen von einer Ansteckung durch einen Kuß , durch ein Trinkglas , durch ein Kleidungsstück , durch ein Bett , durchs Aneinanderliegen , durchs Berühren , durch eine Lanzette , einen Schnäpper , oder durch Schröpfköpfchen \*)

Selten kommt eine solche besondere Idiosynkrasie eines Menschen vor , der durch diese vier Arten nicht angesteckt werden sollte.

Am ersten wird der Theil angegriffen , durch den die Berührung des Gifts am ersten geschehen ist. Sehr

B 2

fels

---

eine Wochenschrift , 3. B. 637. S. — Blochs medicin. Bemerk. S. 151. — Oder Geschichte einer durch eine Aussaugerin auf viele Familien verbreiteten venerischen Krankheit.

\*) Van Swieten Comment. T. V. p. 378.



selten, aber doch zuweilen geschieht es, daß der berührende Theil nicht angegriffen, sondern das Gift aus demselben eingesogen, und alsogleich an einen andern Theil versetzt wird.

Die vorzüglichste Wirkung des Miasmas am angegriffenen Theile besteht in folgendem:

1) im Reitze der festen Theile, aus dem eine schleichende Entzündung, und ein Zufluß der Säfte erfolgt:

2) in einer Ausartung der Säfte in ein eiterförmiges Flüssiges; aus diesem entspringt ein Ausfluß eines solchen Flüssigen, oder eine Anhäufung in dem angestechten Theile:

3) nach diesem folgt eine scheidigte Verschwörung.

Endlich erzeugt das aus dem am ersten angestechten Theile eingesogene Gift, an irgend einem andern Theile, zuweilen auch am ganzen Körper, der ersten Wirkung ähnliche Krankheiten; die sich nur in Absicht auf die Verschiedenheit der angegriffenen Theile von einander unterscheiden.

Folglich kann man die Lustseuche am besten auf folgende Art eintheilen:

1) In die örtliche , die nur einen Theil angreift.

2) In die allgemeine , die schon den ganzen Körper angesteckt hat.

3) In die verlarvte , die unter dem Anschein einer andern Krankheit verborgen ist.

4) In die verwickelte , die mit irgend einer andern Krankheit verwickelt ist.

Die Heilungsart der Lustseuche erfordert 1) das Lustseuchegift hinweg zu schaffen : 2) die davon angegriffenen festen und flüssigen Theile wieder in ihren gesunden Stand zu versetzen.

Es giebt eine erstaunliche Menge Arzneymittel, die man zur ersten Absicht angerühmt hat. Weil aber dieselben ihrer Erwartung in der Folge doch nicht entsprachen , so kamen sie auch wieder in Vergessenheit , oder wurden wenigstens nur als mitwirkende Mittel (*secundaria*) gebraucht. Die wirksamsten unter diesen sind : das Quayackholz , — das Sassafrasholz , — die Sarzaparillewurzel , — die Sandriedgraswurzel \*) (*rad. caricis arenariae*) — die Klettens-

B 3

wur-

---

\*) *Histoire de l' academie des sciences a Berlin* , I. 24. Der berühmte Gleditsch sagt die Sandriedgraswurzel habe mit der theuren Sarzaparillewurzel in venerischen Krankheiten gleiche Wirkung.

wurzel , — die Chinawurzel , ( *rad. chinae nodosae* ) — die Rinde der Seidenbastwurzel , ( *mezerai* ) — die Stengel des Sirschkrauts , ( *dulcamara* ) — die Lustseuchelobelie , — der rohe Spießglanz \*) — das Gottesgnadenkraut , ( *gratiola* \*\*) der Mohnsaft. \*\*\*)

Unzählige Erfahrungen haben aber erwiesen , daß das Quecksilber das einzige , beste , und sicherste Gegengift , des Lustseuchegifts sey , welches diesem spezifisch widersteht.

Die Art , das Quecksilber zu geben , ist aber überhaupt zweifach : denn es wird entweder äußerlich oder innerlich in den Körper gebracht.

Äußerlich braucht man es  
in der Quecksilbersalbe ,  
in der Sinneräucherung ,  
in einem Waschwasser aus der wässerigten  
Auflösung des ätzenden Quecksilbersublimats.

In=

\*) Böhm. *Diff. varia syphilidis therapia* , Argent. 1771 , sie steht auch in Herrn Baldingers *sylloge select. opusculorum* . p. 200.

\*\*) Kozłowski , *Diff. de gratiola* , Vindob. 1775. p. 50.

\*\*\*) Medizinische Beyträge I. Theil. p. 285. Über die Wirksamkeit des Opiums in der Kur venerischer Krankheiten von Dr. Michaelis.



Innerlich giebt man es entweder  
allein,  
vermischt, oder  
zubereitet.

Eine jede dieser Methoden ist mehr oder weniger  
wirksam, gefährlich, unbequem.

Die Einsalbung mit der Quecksilbersalbe wird  
eingetheilt:

In die den Speichelfluß erweckende, wenn man  
sich der Quecksilbersalbe täglich in solcher Menge be-  
dient, daß der Speichelfluß erfolgt, und diesen un-  
ter fortgesetztem Einsalben durch 6 — 8 Wochen un-  
terhält.

In die auslöschende; (*extinctoria*) wenn man  
nach gebrauchten 30 Bädern, und Ausführungen aus  
den ersten Wegen, bey einer guten Kost, und dem fort-  
gesetzten Gebrauche eines reinigenden Dekokts nur jedem  
dritten Tage zu einem Skrupel oder darüber einsalbet.  
Die Quantität der Salbe muß man behutsam, wenn  
es nöthig seyn sollte, vermehren; kommen aber die Zei-  
chen des Speichelflusses zum Vorschein, so muß man  
durch einige Tage aussetzen, und ein gelind abführendes  
Mittel geben; die schicklichsten Orte zur Einsalbung  
sind, die innern Seiten der untern und obern Glied-

maßen, und die Schamweichen. Die Einsalbung muß am Feuer vom Kranken selbst gemacht werden.

Die erste Methode ist sehr unbequem; wegen des Erstickens und anderer schwerer Zufälle sehr gefährlich; wegen des geschwind wieder erfolgenden Austrittes des Quecksilbers aus dem Körper sehr unsicher, und unwirksam; wegen der leichten Absehung des Quecksilbers an verschiedene Orte des Körpers sehr zu fürchten; und, weil man, wie die Erfahrung gelehrt hat, die Lustseuche ohne einen Speichelfluß vollkommen heilen kann, unnöthig.

Die zweite Methode ist wegen der zu befürchtenden Quecksilberabsehung, der langsamen Heilung, und des nicht selten schwer zu hemmenden Speichelflusses, kaum besser, als die vorige.

Die Zinnoberräucherung ist wegen der Gefahr des augenblicklichen Erstickens, und des selten zu hemmenden Speichelflusses zu verwerfen.

Das Waschwasser von der wässerigten Auflösung des ätzenden Sublimats ist wegen der ungewissen Menge des eingesogenen Gifts sehr gefährlich.

Das bloße oder rohe Quecksilber, in größerer Menge verschluckt, wird in den Därmen nicht eingesogen, sondern läuft größtentheils wieder durch den After  
hin

hinaus; folglich ist die davon gehoffte Heilung ungewiß, oder sie erfolgt gar nicht.

### Vermischt ist das Quecksilber

- 1) Mit Krebssteinen; wie im (unrecht sogenannten) alkalisirten Quecksilber.
- 2) Mit Zucker; wie im Zuckerquecksilber (*merc. saccharatus.*)
- 3) Mit Schwefel; wie im Quecksilbermoehre (und im Zinnober.)
- 4) Mit Manna, rohem Sonig, oder Rhabarber; wie in dem mit Manna, Sonig, oder Rhabarber versetztem Quecksilber.

Alle diese beygemischte Arzneymittel gehen in den ersten Wegen vom Quecksilber wieder leicht los; folglich kömmt wenig von diesem bis ins Blut; folglich ist auch die von allen diesen zu hoffende Heilung äußerst langsam, und unsicher.

### Zubereitet ist das Quecksilber

- 1) Mit dem Vitriolsauren; wie im mineralischen Turbith.



- 2) Mit dem Salzsäuren; wie im ätzenden Sublimat, im versüßten Quecksilber, in der aquila-alba, oder dem Kalomel.
- 3) Mit dem Salpetersäuren; wie im rothen Präzipitat.
- 4) Mit dem Essigsäuren; wie in den Kaiserschen Pillen (*pilis Kaiseriani.*)
- 5) Mit dem Weinsäuren; wie in der (*aqua vegetomercuriali.*)
- 6) Durch langes Reiben in einen Kalk (in die Gestalt eines Kalks) verwandelt; wie in dem (unrecht sogenannten) durch sich selbst niedergeschlagenen Quecksilber. \*)

Alle diese Quecksilberzubereitungen sind, in größern Dosen, und lange gegeben, sehr gefährlich, und verursachen schädliche Speichelflüsse, Darm Schmerzen, Auszehrung, Blutspeyen, Schwindsuchten. In kleinern Dosen gegeben, wirken sie nur langsam, und als lindernde (*palliativa*) Mittel; ohne doch, wie mich eine vielfältige Erfahrung gelehrt hat, das Uebel aus dem Grunde zu heben.

Das

---

\*) Alle diese und noch mehrere, Quecksilberzubereitungen habe ich im 2ten Bande meiner *insit. chemicarum*, und in der chemischen Geschichte der Quecksilberzubereitungen sehr umständlich abgehandelt. v. W.

Das Gummiquecksilber, welches aus einem Theile laufenden Quecksilber, und drey Theilen arabischen Gummi besteht, die man mit dem mit Rhabarber versetzten Eichorienshrop zu einem Schleim abreibt, wird unter der Gestalt der Pillen, oder eines Syrops, oder einer Mixture also gegeben, daß frühe und abends 10 Grane desselben in den Körper kommen.

Dieses Gummiquecksilber wird weder durch den Geruch, noch durch den Geschmack, so wie die übrigen Quecksilberarzneyen beschwerlich.

Es dringet leicht in die zweyten Wege, und durch alle Gefäße.

Es erweckt sehr selten einen Speichelfluß.

Es wird nicht metastatisch abgesetzt, wie dieß bey dem mit Fette abgeriebenen Quecksilber zu geschehen pflegt; weil der Schleim des arabischen Gummi das Quecksilber selbst in einer Flüssigkeit nie verläßt.

Es kann durch keine giftartige Schärfe, wie die salzigten Quecksilberzubereitungen, schaden.

Man kann es allen Subjekten, auch Kindern, Schwängern, Ausgezehrten, und Schwachen geben; welches man von der Quecksilbersalze, und den salzigten Quecksilberzubereitungen nicht sagen kann.

End-

Endlich heilet es, wie ich aus der Erfahrung weiß, alle venerischen, durchs Quecksilber zu heilende Krankheiten; ja, ich habe auch mehrere durchs Gummiquecksilber geheilt, die durch die übrigen Quecksilberarzneyen nicht geheilt worden waren.

Man bedarf dabey der verdrüßlichen Vorbereitung durchs Baden nicht; es ist nicht nöthig, seine Geschäfte dabey zu versäumen, oder in einem geheizten Zimmer eingeschlossen zu seyn.

Diese Methode kömmt armen Leuten nicht theuer zu stehen.

Die Vorbereitung des Kranken beym Gebrauche des Gummiquecksilbers erfordert.

1) Eine Aderlässe, wenn der Kranke vollblütig ist.

2) Ein abführendes Mittel, welches alle zehn Tage wiederholt werden muß.

3) Einen verdünnenden, einwickelnden Trank aus der Sargaparille, und der Klettenwurzel, wenn das Temperament des Kranken hitzig, und strang ist, oder aus dem Quayatholze, wenn es kalt und schlapp ist.



4) Eine gesunde Diät ; schwer zu verbauende , fette , saure Speisen sind zu meiden.

5) Eine heitere Luft ; Kälte ist schädlich. Heißes Zimmer , und allzu warme Kleidung erweckt leicht den Speichelfluß. Wenn es die Witterung gestattet , soll der Kranke spazieren gehen.

6) Zeigen sich Zeichen des Speichelflusses im Munde ; so unterläßt man den Gebrauch des Quecksilbers durch einige Tage , und giebt ein abführendes Mittel.

7) Wenn die Krankheit schon eingewurzelt ist , so müssen in = und vor dem Gebrauche des Quecksilbers warme Bäder gebraucht werden : ist sie noch nicht so alt ; so kann man derselben entbehren.

8) Der Gebrauch des Quecksilbers muß so lange fortgesetzt werden , bis das ganze venerische Gift getilget ist. Dieß erkennt man , wenn die Krankheit vom Gebrauche des Quecksilbers nicht mehr verändert wird , und wenn der Kranke dasselbe nicht mehr so gut wie vorher ertragen kann. In diesem Falle hört man indessen auf , das Quecksilber zu gebrauchen , und fährt fort , die Krankheit mit gewöhnlichen Arzneyen zu behandeln. \*)

Wis

---

\*) Diese Regel ist in der Kur der Lustseuche von grosser Wichtigkeit. Sehr oft sah ich , daß Feigwärzen , und Hals-

Bis ißt weis man noch kein spezifisches Mittel, die speicheltreibende (*sialogoga*) Kraft des Quecksilbers gänzlich zu unterdrücken. Weder der Schwefel, noch der Kampfer, noch die Fiebertinde, noch das mit dem Quecksilber gegebene Eisen, bringen dieß zuwege. \*)

Alle acht Tage gegebene abführende Mittel hingegen, nur in kleinen Dosen täglich gegebenes Quecksilber, schleimigte Dekotte, nicht sehr warm gehaltenes Haupt, und Hals, frische Luft, und Vermeidung des Tabakrauchens verhindern und hemmen den Speichelfluß.

Von

---

Halsgeschwüre anfänglich zwar auf den innerlichen Gebrauch des Quecksilbers sehr merklich besser wurden, endlich aber lange im nämlichen Stande blieben, und der Kranke, der vorher das innerlich gegebene Quecksilber lange gut ertragen hatte, endlich mit verschiedenen Zufällen, z. B. Mattigkeit, einem kleinen Fieber, Esslustmangel, Husten, und Brennen im Munde befallen ward. Alle diese Uebel hörten nach indessen unterbrochenem innerlichen Gebrauche des Quecksilbers auf, und die Feigwärzen und Geschwüre wurden bloß durch äußerliche Mittel leicht geheilet, wie ich weiter unten bey der venerischen Bräune durch Beyspiele in den Zusätzen zeigen werde. Der Regel, welche viele sehr einschärfen, daß man das vorher gebrauchte Quecksilber präparat nun unter einer andern Gestalt verschreiben müßte, wenn die Krankheit im nämlichen Stande bliebe, habe ich in meiner Praxis nie nöthig gehabt; sie würde auch auf diesen Fall nicht passen.

# Von den venerischen Krankheiten insbesondere.

Krankheiten des männlichen Glieds.

(Morbi membri virilis.)

Venerischer Tripper; unrichtiger Saamenfluß.

(gonorrhæa venerea.)

Es ist ein tröpfelnder Ausfluß eines eiterförmigen Schleims aus der Harnröhre, oder der Eichel \*)

Die beim Tripper ausfließende Feuchtigkeit ist kein Saame, und auch kein ächtes Eiter, sondern ein Schleim aus den Schleimdrüsen, den das venerische Gift in ein scharfes gelbgrünlichtes Flüssiges verwandelt, durch welches ein gesundes Frauenzimmer während dem

---

\*) Einige glauben, der venerische Tripper wäre im J. 1540 am ersten bekannt geworden; es hat ihn aber Alexander Benediktus schon 1463 gesehen; S. des Herrn von Gallers *Biblioth. Medicinæ practicae*; T. I. pag. 475. Der, wie Becker sagt, schon 1340 in London bemerkte Tripper scheint bloß aus einer geilen Unreinigkeit entstanden zu seyn, weil er durch so leichte Arzneymittel gehoben wurde. S. *Philosoph. Transact.* Vol. 30 No. 359. und Herrn Leste's ansehnliche Abh. aus den *philosoph. transact.* 2 Th. S. 290.



dem Beyschlaf mit einem venerischen weissen Flusse angesteckt wird. \*)

Es ist auch ein Geschwür in der Harnröhre nicht als die nächste Ursache des Trippers anzugeben. Denn sehr selten trifft man bey dem Tripper ein Geschwür in der Harnröhre an; wie dieß die Leicheneröffnungen gezeigt haben. \*\*)

Das

\*) Das lateinische Wort: gonorrhoea, kommt vom griechischen γονη Saame, und ρεω fließen; weil indessen bey dem venerischen Tripper der Schleim der Harnröhre aber nicht der Saame auströpfelt; so könnte man den selben schicklicher männlichen weissen Fluß (leucorrhoea virilis) nennen. Daß aber bey dem Tripper der Saamen nicht ausfließe, beweiset die Fähigkeit der Tripperigten, diesen von sich zu lassen, nebst andern Beweisgründen. s. Herrn Tode vom Tripper, in Ansehung seiner Natur und Geschichte, 1774.

\*\*) Ich habe einen am Seitenstiche Verstorbenen, zugleich mit einem sehr starken Tripper behafteten Soldaten eröffnet, und in seiner Harnröhre eine Röthe und einen gelben aus den Löcherchen derselben herausschwitzenden Schleim, nirgends aber ein Geschwür vorgefunden. Das nämliche hat neulich der fürtreffliche Herr Professor Stoll angemerkt, und ebenfalls in dem Körper eines Venerischen die Harnröhre nur wenig entzündet gesehen, so daß sich die Entzündung auf anderthalb Zolle, von der Oeffnung der Röhre an zu rechnen, erstreckte. Etwas vor der Eichel war wieder eine kleine Entzündung des Kanals: Geschwüre sah man nirgend, der übrige Theil der Harnröhre, die Hoden und die Saamen-

Das Trippergift scheint vom venerischen nicht verschieden zu seyn. \*)

Die

menbläschen waren ganz gesund. *S. Ratio medendi, P. II. p. 402.* Mehrere Leicheneröffnungen mit dem Tripper behafteter Personen findet man bei dem berühmten Morgagni *de sedibus et causis morborum, epist. 40.*

\*) Herr Tode behauptet in dem Werke: Nöthige Erinnerungen für Aerzte und Kranke, die den Tripper heilen wollen, Kopenhagen, 1777. S. 13. das Trippergift wäre nicht venerisch, sondern einer besondern Art, aus welchem nicht die gemeine Lustseuche, sondern andere durchs Quecksilber nicht heilbare Krankheiten entstünden. Den Beweisgründen, mit denen Herr Tode seinen Satz zu unterstützen sucht, hat Herr Prof. Richter, *S. chirurg. Bibliothek 3. B. 3. St. S. 505.* sehr wichtige Zweifel entgegen gesetzt. Ich kenne zwar meine Schwäche allzu gut, um bey dem Streite dieser grossen Männer über die venerische Natur des Trippers mich nicht mit auf den Kampfplatz zu wagen: indessen muß ich doch, aus Liebe zur Wahrheit, bekennen, daß mir die Todeschen Beweisgründe noch nicht ganz überzeugend zu seyn scheinen. Unter den vorzüglichsten Ursachen, warum Herr Tode den Tripper für nicht venerisch hält, ist die Bemerkung, daß man den Tripper ohne Quecksilber heilen kann, und daß diese Krankheit vom Quecksilber nicht geheilet wird. Auf das erstere antworte ich, das venerische Gift könne aus keinem Theile des Körpers so leicht, als aus der Höhle der Harnröhre und der Mutterscheide, ohne Quecksilber getrieben werden; und aus eben dieser Ursache werde auch der Tripper ohne Quecksilber öfters vollkommen geheilet. In Absicht aber auf den Gebrauch des Quecksil-

fil-

Die Kennzeichen , durch welche sich der venerische Tripper vom nicht venerischen unterscheidet , hat man von einem vorhergegangenen verdächtigen Beyschlafe , der grünlichten Farbe der ausfliessenden Feuchtigkeits , und dem Harnbrennen herzuleiten ; das einzige und sicherste Kennzeichen ist aber die Ansteckung einer gesunden Frauensperson. \*)

Der

---

silbers bey'm Tripper kann ich als ein rechtschaffener Mann versichern , viele Tripper und weisse Flüsse durch Quecksilbereinspritzungen geheilet zu haben. Indessen sind noch andere Beweisgründe des angeführten Satzes , auf die ich nicht antworten kann ; z. B. warum man den Tripper auf Otaheite noch nicht bemerkt hat , ohngeachtet die Lustseuche dort schon ziemlich um sich greift ? S. Herrn Lode's mediz. chirurg. Bibliothek , 7. B. I. St. S. 31.

\*) Man muß den venerischen Tripper vom nicht venerischen wohl unterscheiden : denn ich habe bey einem dreijährigen Knaben einen eiterförmigen Ausfluß bemerkt , der von einer blossen Unreinigkeit an dem Zeugungstheile herkam , die wieder einer angeborenen Phymosis ihr Daseyn zu verdanken hatte. Das nämliche sah Herr Alir *Observat. chirurg. Fascic. II. p. 63.* bey einem vier und zwanzigjährigen Bauer. Es kann eine Mannsperson durch den Beyschlaf mit einem Frauenzimmer , die einen scharfen , aber doch nicht venerischen weissen Fluß hat , den Tripper bekommen. Hr. Whytt , S. neue Versuche und Bemerk. von einer Gesellschaft zu Edinburg , 3. B. S. 441. sah aus der ins männliche Glied abgesetzten arthritischen Materie Tripper entstehen. Herr Austerdinger , S. Anleitung für das Landvolk in Absicht auf seine Gesundheit , 1774 S.



Der Sitz des gemeinen Trippers ist in den Morgagnischen Schleimbölen (lacunae) der Harnröhre.

Der Tripper ist, in Absicht auf seine Natur einfach; dieser ist noch nicht eingewurzelt, und ohne eine andere Krankheit:

§ 2

ein

472., hat einen Tripper von einem galligten Unrathe in den ersten Wegen bemerkt. Herr Brendel versichert, *Dissertatio de haemorrhoid. interceptis, morbos verendorum aphrodisiacos simulantibus*, im 2ten Bande seiner *Opusc.* S. 77. §. 17., ein bössartiger (*virulentum*) Ausfluß aus der Harnröhre sey zuweilen ein Zufall beym gehemmten Mastdarmblutflusse. Endlich habe ich bey einem sehr reinlichen Manne von einem Harnblasensteine einen eiterförmigten, zuweilen hinwegbleibenden, Ausfluß gesehen. Einen ähnlichen Ausfluß haben andere sehr glaubwürdige Männer vom frischen Biere, von Blasenkräutern (*cantharides*), und vom Genuße scharfer Speisen angemerkt: S. Herrn Fordyce's Untersuchung der venerischen Krankheiten, S. 39. und Herrn Sauvages *Nojolog. method.* T. II. p. 401. — Alle diese nicht venerischen Tripper erkennt man, weil sie nicht lange währen; bald fließen, bald wieder aufhören; ein Frauenzimmer durch den Bey Schlaf nicht anstecken, und gemeinlich, nach hinweg geschaffter Krankheit, von welcher sie entstanden sind, von sich selbst hinweg bleiben. Der wahre, von einer Erschlappung der ausspritzenden Gefäße (*vasa ejaculatoria*), oder vom Beyschlase, oder von Selbstbefleckungen entstandene Saamenfluß hingegen zeichnet sich durch die Rückenschwindsucht (*tabes dorsalis*) und den Ausfluß eines wahren Saamens aus. S. Secker Abhandl. über den Tripper 1787. Leipz. Dieser Verfasser hat am richtigsten von dem venerischen und nicht venerischen Tripper geschrieben.

eingewurzelt , der schon von langer Zeit her dauert.

Verwickelt , der mit einer andern Krankheit verbunden ist. Sind Geschwüre der Harnröhre zugegen , so entsteht leicht die Lustseuche ; weil das Gift durch diese leichter , als ohne diesen , eingesögen wird.

1) Einfacher Tripper. Einige Tage , selten einige Wochen , nach einem unreinen Beyschlasse , entsteht ein nicht unangenehmer Kitzel in der Eichel und in der Harnröhre des männlichen Glieds. Die Oeffnung in der Eichel schwillt an , wird roth , heiß , und steht auseinander : in der Oeffnung der Harnröhre sieht man einen kleinen Theil dünner Jauche ; bald darauf erfolgt ein brennender , und gleich Nadeln stechender Schmerz während dem Harnen , hauptsächlich gegen das Ende des Harnens ; es trieft auch ein gelbgrünlichter , zuweilen mit blutigen Streifen gemischter Schleim in grösserer Menge aus der Harnröhre ; zugleich wird dieselbe bis an den Hals der Harnblase steif.

Endlich lassen alle Zufälle der Entzündung sammt dem Schmerze allmählig nach , der Harn verursacht kaum ein Brennen , und der austriefende Schleim wird mehr weißlicht und gleichförmig.

Am Ende verspührt man beim Harnen gar keine Schmerzen ; es trieft ein weisser , jähler , in Fäden zieh-

ba

barer Schleim aus der Harnröhre; nach und nach wird die Menge desselben so gering, daß nur einige Tröpfchen den Tag oder die Nacht hindurch ausgedrückt werden können; aber auch dieß bleibt in der Folge ganz hinweg.

Man sieht also, daß der ganze Verlauf dieser Krankheit in vier Zeiträume eingetheilt werden könne.

1) In den Zeitraum der Ansteckung, vom unreinen Beyschlaf bis zum Anfange des Harnbrennens; er währet gemeiniglich einige Tage, zuweilen aber auch viel länger.

2) — — — der Entzündung; man erkennt ihn an dem Entzündungsschmerze, dem Fieber, dem Harnbrennen; der Kranke wird durch eine oder zwei Wochen davon geplagt.

3) — — — der Eiterkochung (*purulescentiae*); man erkennt ihn in der Abwesenheit des Harnbrennens; er währet aber durch einige Wochen.

4) — — — der Schleimkochung (*mucoscentiae*); man erkennt ihn am Ausflusse einer kleinen Menge eines ungefärbten Schleims.

Die Heilungsart des einfachen Trippers ist, nach Verschiedenheit des Zeitraumes, auch verschieden.



Der Entzündungszeitraum erfordert

1) Eine Aderlässe , wenn die Entzündung und der Schmerz am männlichen Gliede stark sind , sonst aber nicht.

2) Einen erweichenden , und zugleich der Entzündung entgegen gesetzten Absud ; den man aus der Eibischwurzel , der Sargaparillenwurzel , dem Pappelkraute , dem Weinsteinram , dem Salpeter , und den Klapperrösen , oder dem Mohnsaamenssyrop bereiten kann : oder

3) eine kühlende Saamenmilch aus Melonenkernen , oder Mandeln mit Salpeter , und weissen Mohnsyrop. Diese muß der Kranke häufig und so lange trinken , bis der Schmerz beym Harnen hinweg ist.

4) Ein gelind abführendes Pulver aus Rhabarber , Austerschalen und Glauberschen Salze ; welches man alle viertel Stunde zu einem halben Quentchen nimmt.

5) Die Diät soll gering und der Entzündung entgegen gesetzt seyn. Wein , Bey Schlaf , Reiten , Selbstbefleckung ist zu meiden.

6) In diesem Zeitraume sind abführende , harzigte , scharfe , balsamische Mittel , z. B. der Ropaiwabalsam , der Terpenthin , der Schwefelbalsam , die scharfe Spießglantzinktur , und zusammenziehende Einspritzungen sehr schäd.

schädlich; weil sie entweder die Entzündung verstärken, oder den Tripper mit der größten Gefahr unterdrücken.

Der eiterkochende Zeitraum erfordert

1) ein gelind abführendes mit einigen Tropfen Ropaiwabalsam versetztes, Pulver. \*)

2) Einen reinigenden Tranke aus der Klettens-  
wurzel.

3) Eine Quecksilbereinspritzung aus einer halben Drachma versüßten Quecksilber, einer Unze Schleim vom arabischen Gummi, und einem Pfunde destillirten Wasser. Die Einspritzung muß den Tag hindurch dreymal vorgenommen werden. \*\*)

E 4 Der

\*) Einige rühmen den Vorragen- und Ochsenzungenextrakt s. Journ. de Pharmacie; andere haben den Eisenhüttenextrakt, andere den Gottesgnadenkrautextrakt in diesem Zeitraume nützlich gefunden.

\*\*) Der innerliche Gebrauch des Quecksilbers verändert zwar die Bosartigkeit des Trippers in eine gelindere Feuchtig-  
keit, und beschützt den Kranken vor der Ansteckung durchs eingesogene Luftseuchegift; aber den Tripper selbst schafft er doch nicht gänzlich hinweg. Denn das Miasma steckt in dem Schleim der Schleimhöhlen der Harnröhre, den es gleich einem Hefen, immer verderbt, und in welchem das innerlich gegebene Quecksilber kaum etwas wirkt. Eine Quecksilbereinspritzung hingegen zerstört leicht den Schleim selbst, und das darinn hervor-  
gene

Der schleimkochende Zeitraum erfordert innerliche stärkende Arzneyen aus der Fiebrerrinde, Eisen, Zimmet, die mit Wein aufgegossen (insundirt) werden, und Mercurialeinspritzungen.

2) Eicheltripper. Es ist ein Triesen eines eiterförmigen Schleims aus den Aussonderungslöcherchen der Eichel.

Die Heilungsart ist, so lange die Entzündung währet, wie bey'm Harnröhretripper; im schleimkochenden Zeitraume hingegen muß man, anstatt eine Quecksilbereinspritzung anzuwenden, das Glied in der Quecksilberauflösung baden.

3) Veralteter Tripper, der schon durch viele Monate oder Jahre währet. Die Ursache dieser Eattung ist entweder ein veraltetes Geschwür in der Harnröhre, oder eine verlorne Spannkraft der Aussonderungsgänge derselben.

Den veralteten Schleimtripper, welchen die Engländer gleet nennen, erkennt man an dem Austriesen eines dünnen Schleims, und dem Mangel eines örtlichen Schmerzes in der Harnröhre. Die Ursache ist ein öfters wiederholter Benschlaf während dem Tripper;

---

gene Luftfeuchegift; man sieht also, warum diese zur Heilung des Trippers zuträglich ist, als der innerliche Gebrauch des Quecksilbers.



per ; allzulange gebrauchte balsamische Arzneyen ; eine angebohrne , oder vom Alter , oder irgend einer andern Krankheit erzeugte Erschlaffung der Schleimböhlen.

Die Heilungsart erfordert innerlich und äußerlich stärkende Mittel ; z. B. eine mit Vitriol versetzte Einsprizung ; ein kaltes Bad des männlichen Glieds ; einen stärkenden , mit der Fiebereinde , der Winterschen Rinde , dem Eisen , oder mit bittern Substanzen , z. B. dem Gottesgnadenkraute , versetzten Wein.

Den veralteten schwürichten Tripper erkennt man an dem Austriefen einer eiterigten Jauche , und am örtlichen Schmerze an irgend einem Theile der Harnröhre , welchen der Kranke während dem Harnen , oder Einschieben des Kerzchens , oder beym Drucke des Fingers verspührt.

Die H. N. erfordert :

1) Innerlich den Gebrauch des Gummiuuecksilbers.

2) Ein mit Quecksilberbalsam bestrichenes Kerzchen einzuschieben.

3) Die Quecksilberauflösung einzuspritzen.

## Venerisches Harnbrennen.

( dysuria venerea. )

Es ist ein brennendes und schmerzendes , vom Luftpfeuchgift entstandenes Harnen.

Gattungen sind :

1) Entzündungsartiges H. von einer Entzündung der Harnröhre , die ein sehr heftiges Brennen während dem Harnen , ohne einen Ausfluß eines eiterförmigen Schleims aus der Harnröhre , verursacht. Aus dieser Ursache haben es einige Schriftsteller den trocknen Tripper genannt.

Die Heilungsart erfordert

- 1) Zur Uder zu lassen.
- 2) Eine kühlende Saamenmilch.
3. Den Libischabsud , oder den Leinsaamenaußguß.
4. Ein antiphlogistisches abführendes Mittel.
5. Gummiuecksilberpillen.
6. Das männliche Glied mit Milch , in welcher Gummiuecksilber abgekocht worden , zu baden.
7. Gel und Quecksilbermilch einzuspritzen.

2) Tripperigtes H. Es ist ein Zufall beym frischen Tripper ; denn Leute , die schon vielmal den Tripper gehabt haben , empfinden beym Anfange dieser Krankheit gar kein Brennen , oder doch nur ein sehr geringes. Zuweilen folgt es aber auf den bössartigen , durch zusammenziehende Mittel unterdrückten Tripper. Der Schmerz hört auf , oder läßt wenigstens nach , sobald die Tripperfeuchtigkeit wieder zu fließen anfängt.

Die Heilungsart ist wie bey N. I. Man muß sich hüten , zur Wiederherstellung des Trippers , hitzige Mittel anzuwenden.

3) Schwürigtes H. Bey Männern von Geschwüren in der Harnröhre , bey Weibern von Geschwüren an der Oeffnung der Harnröhre. Diese Gattung hält lange an ; man erkennt sie an einem örtlichen Schmerze. Die H. A. s. Geschwüre der Harnröhre.

4) Weißflüssiges H. Es ist ein Zufall beym weissen Flusse , wo sich eine Entzündung um die Oeffnung der Harnröhre einfindet : denn bey einem einfachen weissen Flusse ist , beym Anfange der Krankheit , kaum ein Harnbrennen zugegen. Die H. A. ist wie bey N. 2.



## Venerische Harnhemmung.

( Ischuria venerea, )

Es ist ein beschwerliches, oder ganz gehemmtes Harnen; der Harn fließt dabey wie ein dünner, einfacher, oder gedoppelter Faden heraus, oder wird nur tropfenweise mit der größten Mühe ausgepreßt.

Gattungen sind:

1) Entzündungsartiges H. Zuweilen nimmt eine Entzündung der Harnröhre oder der Vorsteherdrüse bey'm Anfange des Trippers, oder wenn dieser durch zusammenziehende Einspritzungen unterdrückt worden ist, so sehr zu, daß der Ausfluß des Harns entweder ganz verstopft, oder sehr schwer gemacht wird.

Diese Gattung wird vom Gebrauche des Harnziehers ( Katheter ) oder der Kerzchen sehr verschlimmert.

Die Heilungsart erfordert die antiphlogistische Heilungsart des entzündungsartigen Harnbrennens, die im vorigen Abschnitte N. 1. angezeigt worden ist. Wird das Harnen durch diese Methode nicht bald erleichtert, so muß man den Blasenstich machen, und mit der antiphlogistischen Methode fortfahren.

2) H. von einer Verhärtung der Vorsteherdrüse. Man erkennt diese Gattung an einer nicht  
ent-

entzündeten, die Oeffnung der Harnröhre verengernden Geschwulst. Wenn man den Finger in den Mastdarm des Kranken bringt, so kann man die Geschwulst der Drüse sehr gut fühlen.

Die Heilungsart erfordert den innerlichen Gebrauch des Gummi-Quecksilbers mit dem Extract des Eisenhütchens, der Belladonna, des Gottesgnadenkrautes, des Quajackgummi, und anderer auflösender Mitteln.

Außerlich legt man die Quecksilbersalbe mit in Milch gekochter Alraunwurzel auf das Mittelfleisch. S. Verhärtung der Vorsteherdrüse. In die Harnröhre schiebt man ein Kerzchen.

3) H. von einer knottigten Anschwellung der sächerförmigen Substanz der Harnröhre. Diese Substanz pflegt wegen einer örtlichen verlorren Spannkraft der die Höhle der Harnröhre bildenden Membran gleich Knötchen in die Höhlung der Harnröhre hier und dort hervor zu ragen. Man erkennt dieses Uebel, wenn man mit dem Harnzieher einen glatten und weichen im Wege stehenden Körper verspührt.

Die Heilungsart erfordert den Gebrauch der Kerzchen.

4) H. von einer Anschwellung des verumontani, oder einem Knötchen irgend einer grössern Drüse. Dergleichen Anschwellungen sind zuweilen schwammigt, zuweilen schwieligt, und verhärtet.

5) H. von schwieligten und angeschwollenen Geschwüren der Harnröhre. Man erkennt sie an dem Ausflusse eines dickern Eiters, oder einer dünnern Fauche aus der Harnröhre. Die Heilungsart erfordert mit dem Quecksilverbalsam bestrichene Kerzchen.

6) H. von Narben in der Harnröhre, welche schwieligte, die Harnröhre verengerende, Schnüre bilden, durch den Harnzieher erkannt, und durch die Kerzchen geheilet werden.

7) Wärmigte H. von einer fleischigten, weichen Warze, die in der Höhle der Harnröhre nach Geschwüren an diesem Theile zurück geblieben oder entstanden ist. Man sagt, sie würde an einem weichen im Wege stehenden Körper durch den Harnzieher, und an dem in einem gedoppelten Strahl herausfliessenden Harn erkannt. Sehr selten aber ist eine Fleischwarze die Ursache einer venerischen Harnhemmung.

Die Heilungsart erfordert die Kerzchen.

8) H. von einer von sich selbst entstandenen Zusammenziehung der Harnröhre. Man erkennt sie,  
wenn



wenn der Harn in einem dünnen Faden ausfließt, und der Harnzieher zeigt, daß die Harnröhre entweder durch-  
aus, oder nur hier und dort, verengert sey. Diese  
Gattung wird unter allen übrigen am leichtesten durch  
Kerzchen geheilet.

9. Venerische H. bey alten Leuten. Leute,  
die in ihrer Jugend oft den Tripper gehabt haben, sollen,  
wie einige Schriftsteller sagen, nach ihrem fünfzigsten  
Jahre eine leichte Harnhemmung bekommen, die zuwei-  
len durch mehrere Jahre anhält, und nicht selten in ein  
Harnbrennen übergeht.

Die Zergliederung der an dieser Harnhemmung  
Verstorbenen, hat eine Entzündung der Harnröhre, und  
eine Verengerung derselben, aber keine Fleischwärtchen  
wie man insgemein glaubte, dargestellt.

Alle diese Gattungen der Harnhemmung entstehen  
von vorhergängigen, übel geheilten, oder sich selbst über-  
lassenen Trippern, oder Harnröhrengeschwüren. Es hält  
aber sehr schwer, durchs bloße Forschen mit dem Harn-  
zieher, oder dem Kerzchen die Verschiedenheit der Ur-  
sachen gehörig zu unterscheiden. Indessen ist die Hei-  
lungsart dieses Übels eben nicht so sehr verschieden,  
und erfordert

1) den innerlichen Gebrauch des Gummiqueeßil-  
bers, und des Sarzaparilledekokts; denn durch diese  
Arzneyen wird die Lustseuche hinweggeschafft.

2) Erweichende Bäder, die die Harnröhre schlapp machen, und das Einschieben der Kerzchen erleichtern.

3) Kerzchen, durch welche die Verengerung der Harnröhre erweitert wird. Anfänglich muß man dünne, dann aber nach und nach dickere Kerzchen einschieben. Gleich nach dem Gebrauche des Bades werden sie am leichtesten eingebracht \*)

Des

---

\*) Kerzchen aus Darmsaiten kann man, wenn eine grosse Verengerung der Harnröhre zugegen ist, leichter als die aus einer Wachsmasse gemachten, wie die Goulardschen sind, einschieben. Die Saiten schwellen an, und erweitern auch dadurch die Harnröhre besser; man kann sie überdies wegen ihrer Biegsamkeit länger, ohne einen Reiz zu verursachen, in der Harnröhre lassen. S. Foot kritische Untersuchung der alten und neuen Art die Krankheiten der Harnröhre zu behandeln. S. 103. Diesen sind die hohlen Röhrchen aus dem Federharze noch vorzuziehen, die zugleich den ungestörten Abfluß des Harns erhalten: S. Hrn. Thedens Sendschreiben an den berühmten Herrn Prof. Richter, die neuerfundenen Catheter aus der *Resina elastica* betreffend. Berlin 1777. Man muß aber wohl vermeiden, einen bleernen Harnzieher mit Quecksilber zu bestreichen, und in die Harnröhre zu bringen; denn das Blei wird vom Quecksilber (mit dem es verquicket oder amalgamirt, und also aufgelöst wird,) leicht zerbrechlich gemacht, und ein solches in der Harnblase zurückgebliebenes Stück verschafft dann die Grundlage, oder den Kern eines Blasensteines.

## Venerische Krystallbläschen.

( Vesiculae crystallinae venereae. )

Es sind helle , wie Krystall durchscheinende , einem Senfförnchen an Grösse ähnliche Bläschen an der Eichel oder der Vorhaut.

Gemeiniglich gehen sie nach einigen Tagen in die sogenannten Chankregeschwürchen über.

Die Heilungsart geschieht durch den innerlichen Gebrauch des Gummiweisses , und eine äusserliche Abwaschung mit einer schwachen Quecksilberauflösung.

## Venerische Knötchen am männlichen Gliede.

( Tubercula venerea penis. )

Es sind erbsenförmige , zuweilen etwas grössere Knötchen am männlichen Gliede.

In Absicht auf ihren Sitz werden sie eingetheilt:

1) In R. der Eichel , neben dem Säumchen in der Substanz der Eichel selbst , in den Morgagnischen Drüsen , oder um den Kranz der Eichel in den riechenden Drüsen.

2) In R. der Vorhaut , die an der Vorhaut ihren Sitz haben.



3) In K. der Cowperschen Drüse, gegen das Ende der Schenkel des männlichen Glieds, über der Zwiebel der Harnröhre.

4) In K. anderer Drüsen, die hier und dort am männlichen Gliede hervorkommen.

Nach ihrer Natur sind sie entweder hitzig oder kalt.

1) Die hitzigen erkennt man an der Röthe, dem Schmerze, und dem Ausflusse eines Tripperschleims, wenn sie mit den Fingern gedrückt werden. Zuweilen arten sie in tiefe Geschwüre aus.

Die Heilungsart erfordert die Zertheilung durch inn- und äusserlich gegebenes Quecksilber.

2) Die kalten erkennt man an der Härte und dem Mangel der Entzündung.

Die H. A. ist wie bey N. 1.

### Venerische Eichelgeschwüre.

( Ulcera venerea glandis.)

Es sind Geschwüre, die die Eichel, oder die innere Oberfläche der Vorhaut zerstören, und von den Franzosen Chancres genannt werden.

1) Schwämmchengeschwüre an der Eichel. Sie entstehen aus vorhergängigen Krystallbläschen, sind oberflächlich, und werden, wenn man sie mit der balsamischen Quecksilbersolution des Tages einigemal wäscht, bald geheilet.

2) Gemeine E. Es sind rundlichte am Umkreise rothe, in der Mitte graue Geschwürchen, die breiter und tiefer sind, als die vorigen.

Die Heilungsart erfordert den innerlichen Gebrauch des Gummiuecksilbers. Aeußerlich muß man den Quecksilberbalsam, oder die balsamische Quecksilberauflösung anwenden.

3) Krebsartige E. Diese sind sehr schmerzend, haben ausgestessene und knötigte Ränder, und zerfressen nach und nach die ganze Eichel. S. Krebs des männlichen Glieds.

4) Aeußerliche Geschwüre des männlichen Glieds, die nämlich auf dem Rücken desselben, oder unten, oder auch, wie ich gesehen habe, an den Seiten, zuweilen zu entstehen pflegen.

Die Heilungsart ist wie bey den Eichelgeschwüren

## Venerischer Krebs des männlichen Glieds. ( Cancer penis venereus. )

Es ist eine Ausartung der Eichel oder der Vorhaut in den Krebs.

Sehr übel ist es gehandelt, wenn man ein Eichelgeschwürchen, um das Gift auszurotten, öfters des Tages mit dem Aetzstein, mit dem Silberätzstein, oder mit dem blauen Vitriol reizet; auf diese Art wird oft ein einfaches venerisches Eichelgeschwür in den argsten Krebs verwandelt.

In Absicht auf die Natur ist der Krebs des männlichen Gliedes zweyfach:

1) Gemeiner Krebs. Es ist ein bössartiges Geschwür, welches die Vorhaut und die Eichel unter heftigen Schmerzen verzehrt, unausgesetzt schmerzet, und immer knottigt und blutig ist.

Innerlich muß man das Gummiweiss Silber mit Mohnsaft geben. Außerlich wird die balsamische Quecksilberlösung angewendet.

Wenn diese Arzneyen nicht helfen, so muß man das männliche Glied absezen. Aber auch die Absezung hilft nicht, wenn die Schamdrüsen auch schon, wie ich es selbst gesehen habe, von der Krebsmaterie verhärtet sind.



2) Schwämmigter Krebs. Zuweilen artet, nach übel behandelten Eichelgeschwüren, die Vorhaut, oder die Eichel, oder beides zugleich, in einen höhligten und blutigen, in der Grösse einigen Fäusten gleich kommenden Schwamm aus.

Die Heilungsart. Man muß das männliche Glied absetzen, welches am besten und sichersten, mittelst des Abbindens unter dem Ende des krebfigten Schwamms geschieht \*)

### Venerische Harnröhrengeschwüre.

(Ulcera venerea urethrae.)

Es sind Geschwüre, die in der Höhle der Harnröhre ihren Sitz haben, oder von andern Theilen das Eiter in dieselbe ergießen.

1) Einfaches H. Man erkennt es an einem hartnäckigten Tripper, und einem örtlichen anhaltenden  
D 3      Schmer-

\*) Vor einigen Jahren habe ich einen zwey und dreyßigjährigen Mann, der anstatt der Eichel und der Vorhaut einen zwey Fäuste grossen venerischen Schwamm hatte, durch Abbinden vollkommen geheilet. Bey einem Andern sah ich, daß das männliche Glied von einem Nervenkrebs schon zur Hälfte verzehrt war; es wurde durchs Messer abgesetzt, aber der Krebs hatte in der linken Schamweiche seinen Ursprung, und der Kranke wurde durch eine krebfigte Auszehrung aufgerieben.

Schmerze, und Brennen an der nämlichen Stelle der Harnröhre, währendem Harnen, oder beym äussern Berühren, und beym Einschieben der Kerzchen.

2) Geschwür der Vorsteherdrüse. Man erkennt es an einer vorhergegangenen Eiterbeule dieser Drüse, die in die Harnröhre geborsten ist. S. Eiterbeule der Vorsteherdrüse.

3) G. der Saamendrüse. Man erkennt es an dem Vorhergange einer Entzündung und Vereiterung der Saamendrüse, und am Ausflusse des Saamens aus der Fistel.

4) G. irgend einer grössern Drüse. Man erkennt es am Vorhergange eines kitzenden und tief sitzenden Beulchens am männlichen Gliede, welches dann in Eiterung übergegangen, und in die Harnröhre geborsten ist. Zuweilen brechen, wie ich gesehen habe, diese Geschwüre zugleich in der äussern Oberfläche des männlichen Glieds auf, und lassen den Harn ausfliessen.

Die Heilungsart der in der Harnröhre verborgenen, oder sich in dieselbe öffnenden Geschwüre erfordert, ausser dem innerlichen Gebrauche des Gummi-Quecksilbers, zugleich die mit Quecksilverbalsam bestrichenen Kerzchen.

## Venerische Vorhautanschwellung.

(Phymosis venerea.)

Es ist eine Anschwellung der Vorhaut, wodurch die Entblößung der Eichel verhindert wird. \*)

I) Entzündungsartige B. von einer venerischen Entzündung der Vorhaut.

Diese Entzündung ist selten einfach, gemeiniglich aber mit Geschwüren, Feigwarzen, oder einem Tripper der Eichel oder der Vorhaut verwickelt.

Die Heilungsart erfordert, ausser der Aderlässe und andern innerlichen antiphlogistischen Mitteln, zugleich die Gummiquecksilberpillen; und äusserlich, das männliche Glied mit der Quecksilbermilch, oder der wasserigten Quecksilberauflösung zu baden.

D. 4

Sehr

---

\*) Bey Knaben und Jünglingen, die eine angeborene Vorhautverengerung haben, wird nicht selten, durch die unter der Vorhaut gesammelte Unreinigkeit, die Anschwellung entzündet, und es fließt eine eiterförmige Feuchtigkeit aus: man kann aber diese nicht venerische Vorhautanschwellung durch ein Bad des männlichen Gliedes aus Milch, oder dem erweichenden Dekokt leicht wieder heilen. Herr Alir sah einen solchen Fall bey einem Bauer, welcher von einem ungeschickten Bartscherer für venerisch gehalten wurde, und zur Ehescheidung hätte Anlaß geben können, wenn Herr Alir nicht das Gegentheil bewiesen hätte. S. dessen *Obs. chirurg.* Fascic. II. p. 63.



Sehr selten ist es nöthig, die Vorhaut aufzuschneiden, wenn man sich dieser Methode gehörig bedient, wie ich es vielmal beobachtet habe. Das bloße Baden des Gliedes in lauer Milch, oder im Silberglätzeffigwasser, und das Salben mit der Quecksilbersalbe hat nichts genützt.

2) Durchscheinende B.; es ist eine durchscheinende, wassergeschwulstige, oder seröse Anschwellung der Vorhaut.

Die H. N. erfordert, ausser abführenden Mitteln, und dem innerlichen Gebrauche des GummiQuecksilbers, das Glied mit der wässerigten, mit Weingeiste vermischten Quecksilberauflösung zu baden.

3) Skirröse B.; es ist eine gewöhnlich knötigte Verhärtung der Vorhaut. Innerlich giebt man das GummiQuecksilber mit andern auflösenden Mitteln. Aeußerlich nützt die wässerigte Quecksilberauflösung mit erweichenden Mitteln.

4) Krebsigte B. Die ganze Vorhaut artet zuweilen in einen erstaunlich grossen schwämmigten Krebs aus. S. Krebs des männlichen Glieds

5) Brandigte B. Zuweilen entsteht ein Brand der Vorhaut durch die Schärfe des Lustseuchegifts; öfters aber durch die verkehrte Heilungsart der Entzündung.

zung. Die H. N. erfordert innerlich und äußerlich antiseptische Arzneyen, durch die das Brandigte vom Gesunden nicht abgesondert wird.

## Venerische Vorhautentzündung.

( Paraphymosis venerea. )

Es ist eine venerische Eichelentzündung, durch die die Vorhaut so sehr zurück getrieben wird, daß sie, wie ein Kragen, hinter die Eichel zu stehen kommt.

Diese Krankheit ist von der nicht venerischen Vorhautentzündung wohl zu unterscheiden, die zuweilen von einer gewaltsamen Zurückdrückung der Vorhaut während dem Benschlase entsteht.

Gattung der venerischen V. sind:

1) Entzündungsartige V. ( oder besser, wahre V. ; Paraphymosis inflammatoria, ) die gemeinlich mit Geschwüren oder Feigwarzen der Eichel verbunden ist : sie erfordert, außer der Aderlasse, und dem innerlichen Gebrauche des GummiQuecksilbers, zugleich, das Glied in der Quecksilberauflösung zu baden; und, wenn es möglich ist, die Vorhaut über die Eichel zu ziehen.

2) Brandartige E.; wenn der Brand der Eichel bevorsteht, den man aus der Bleyfarbe ( livor )

derselben erkennt , so muß man die Vorhaut durch Seiteneinschnitte erweitern , und vorwärts ziehen.

Der Brand der Eichel erfordert inn- und äußerlich antiseptische Mittel. Selten greift er über die Eichel weiter um sich ; folglich ist , wie ich gesehen habe , die Absezung derselben niemals nöthig.

## Widernatürliche venerische Steifheit des männlichen Gliedes.

( Priapismus venericus. )

Es ist eine unangenehme , nicht vom Wollustreize entstandene und lange währende Steifheit des männlichen Gliedes.

Gattungen sind:

1) Trippersteifheit. Sie entsteht von der Entzündung der Harnröhre ; aus dieser Ursache ist sie auch ein Zufall beim Harnbrennen , und beim entzündungsartigen Tripper.

Die Heilungsart erfordert das GummiQuecksilber und antiphlogistische Arzneyen, S. entzündungsartiges Harnbrennen.

2) Langwährige w. v. St. Ich habe einen Jüngling gesehen , der , nach einem durch zusammenziehende

Arz

Nyneyen unterdrückten Tripper, schon durch sechs Wochen mit einer solchen widernatürlichen Steifheit, ohne irgend einer andern venerischen Krankheit behaftet war.

Die Seilung erfolgte bey demselben auf den Gebrauch des Gummiuectsilbers und eines Bades des Gliedes mit der wässerigten Quectsilberauflösung, und des Quectsilberliniments, mit welchem man dasselbe bedeckte.

## Widernatürlicher venerischer Wollustkrampf des männlichen Gliedes.

( Satyriasis venerea. )

Es ist eine vermehrte Beyschlafbegierde mit einer wollüstigen Steifheit des männlichen Gliedes, und nicht selten erfolgender Selbstbefleckung.

Gattungen sind:

1) W. v. W. von einem unreinen Beyschlase. Man bemerkt ihn bey dem Zeitraume des Trippers, zwischen der Ansteckung und dem Anfang der tripperhaften Entzündung; folglich ist er ein Zeichen der geschehenen Ansteckung, und ein Vorboth des Trippers.

Er entstehet von einem Reize der Nerven, die durch die Harnröhre vertheilet sind, und welcher auch die Saamenbläschen in Mitempfindung bringt.

Die



Die Heilungsart erfordert, alsogleich Einspritzungen aus der wässerigten Quecksilberauflösung in die Harnröhre zu machen, auf diese Art wird, wie ich beobachtet habe, dem Tripper zuweilen noch vorgebogen.

## Widernatürliche venerische Krümmung des männlichen Gliedes.

( *Curvatura penis venerea.* )

Es ist eine gekrümmte ( *tortuosa* ) entweder auf- oder ab- oder seitwärts gerichtete Beugung des steif stehenden männlichen Gliedes.

Gattungen sind:

1) Tripperartige w. K. Wenn das Säumchen der Vorhaut entzündet ist, so wird, während dem entzündungsartigen Zeitraume des Trippers das Glied, wenn es steif steht, sehr krumm gebogen. Einen mit dieser Krümmung verbundenen Tripper nennen die Schriftsteller einen gespannten Tripper ( *gonorrhoea chordata.* )

Die Heilungsart erfordert antiphlogistische Mittel, und das Gummi-Quecksilber. S. Harnbrennen.

2) W. K. von Knötchen in der Harnröhre. Nach wiederholten Trippern bleiben zuweilen verhärtete Drüsen, oder Knötchen der sächerigten Substanz in der Harnröhre zurück, welche diese Krümmung verursachen. Man

Man bemerkt die Krümmung immer an der dem Knötchen entgegen stehenden Seite. Ist also dieses an der rechten Seite, so steht das Glied nach der linken; ist es an der linken, so steht jenes nach der rechten; ist es unten, so steht das Glied aufwärts; ist es endlich oben, so steht jenes abwärts. Diese Knötchen machen auch den Ausgang des Harns und des Saamens beschwerlicher.

Die Heilungsart erfordert, das Knötchen ober Weulchen hinweg zu räumen; welches aber nicht selten äusserst schwer hält; es steht die Zertheilung oder Vereiterung desselben zu versuchen.

3) W. K. von einem Mangel der Fächerhaut, die an irgend einem Orte des Gliedes durch ein Geschwür, oder eine grosse Vereiterung zerstört worden ist.

Die Heilung ist kaum möglich. \*)

### Venerisches männliches Unvermögen.

( Impotentia virilis venerea.)

Es ist eine Ausleerung eines unfruchtbaren Saamens, oder ein Hinderniß der Aussprizung desselben.

Gat.

---

\*) *Supplément au traité de Mr. Petit sur les maladies chirurgicales, rédigé par Mr. Lesre; und Götting. gel. Nachrichten, Zugabe von 1778. St. 29.*

Gattungen sind :

1) U. von der allgemeinen Lustseuche. Wenn der Saame zugleich vom Lustseuchegift verdorben ist, so taugt er wohl zur Fortpflanzung der Krankheit, aber nicht des Geschlechts.

Die Heilungsart erfordert das Gummiquicksilber.

2) U. von zusammengezogenen Saamenbläschen. Diesen Fehler hat man, nach vorhergegangenen venerischen Krankheiten der Saamenbläschen, zuweilen in den Leichen entdeckt.

3) U. von zusammengewachsenen Oeffnungen der aussprühenden Gefäße. Auch diesen Fehler hat man nach dem Tode vorgefunden. Beide können beim Leben nicht erkannt werden; beide sind also unheilbar.

## Krankheiten der Hoden.

( Morbi testiculorum. )

### Venerische Hodenentzündung.

( Inflammatio testiculorum venerea. )

Es ist eine hitzende und schmerzende Anschwellung einer, oder beider Hoden.

1) Tripperhafte H. Sie entsteht während dem Entzündungszeitraum des Trippers von der Mitempfindung

ung der Harnröhre mit den Hoden, und verschwindet nach gestillter Harnröhreentzündung wieder von sich selbst.

Die Heilungsart erfordert also antiphlogistische Mittel, gesagte Entzündung zu dämpfen. Die angeschwollenen Hoden muß man mit der Hodensackträgerbinde (suspensorium feroti) aufwärts halten.

2) H. von einer örtlichen Entzündung. Ein unterdrückter oder sparsamer fließender Tripper, und ein ausgetrocknetes Eichelgeschwür verursacht oft diese Entzündung, an einer oder beyden Seiten.

Die Heilungsart erfordert

1. Gummiquecksilberpillen, wodurch der Tripperabfluß öfters wieder hergestellt und das Miasma getilget wird:

2. eine kühlende Saamenmilch, und ein antiphlogistisches abführendes Mittel:

3. einen Breiumschlag aus erweichenden Mehlgattungen, die man in Milch oder Wasser kocht; durch welche der Schmerz und die Entzündung gestillet werden.



4. Die Hodensackträgerbinde ; um die angeschwollenen Hoden hinauf zu binden.

3) Vereiternde H. Die Vereiterung der Hoden erkennt man , wenn , nach vorgängiger Entzündung derselben , an einem oder mehrern Orten des Hodensackes ein Schwanken bemerkt wird.

Die H. U. Man muß an dem schwankenden Orte einen Einschnitt machen , um dem enthaltenen Eiter einen Ausgang zu verschaffen. S. Geschwüre des Hodensackes.

### Venerische Hodenverhärtung.

( Induratio testiculorum venerea. )

Es ist eine harte , kalte , kaum schmerzende Anschwellung einer , oder beyder Hoden.

Gattungen sind :

1) H. nach vorgängiger Entzündung : denn diese bleibt zuweilen nach gestillter Entzündung zurück.

Die Heilungsart erfordert :

I. Das GummiQuecksilber mit dem Pulver der Saubechelwurzel.

2. Breyumschläge von in Milch gekochten erweichenden Kräutern und Leinsaamen. Zuweilen hat ein Lini-  
ment aus der Zaurrübe, dem Alraun, dem Gottesgna-  
denkraute und der Quecksilbersalbe mehr genügt.

3. Zuweilen hat auch die Trippereinnimpfung  
durch ein mit Trippereiter bestrichenen Kerzchen Nutzen  
geschafft. \*)

2)

---

\*) So viel mir bekannt ist, hat am ersten Herr Hirschel,  
s. dessen Beobacht. über den izzigen Gebrauch des  
*Mercur. Subl. corros.* 1765 Berlin, eine Meldung von  
der Trippereinnimpfung bey der Hodenverhärtung ge-  
macht. Die Methode dieser Einimpfung ist folgende.  
Man steckt in die Harnröhre eines mit dem bössartigen  
Tripper Behafteten ein Kerzchen, und läßt es durch  
einige Stunden darin, bis es mit dem Trippereiter  
wohl bedeckt ist. Nun bringt man es allso gleich in die  
Harnröhre des gegenwärtigen, von einer, nach unter-  
drücktem Tripper erfolgten, Krankheit geplagten Kran-  
ken, und läßt es auch hier wieder durch 4 = 6 Stun-  
den, bis sich ein Brennen, und die übrigen Tripperzu-  
fälle einfinden. Der sehr erfahrene Stabswundarzt,  
Herr Odenkirchen hat bey einem dreyßigjährigen Sol-  
daten, welcher an der linken Hode eine verhärtete Ge-  
schwulst hatte, die zwo Fäuste groß, und holzhart  
war, auch beym bloßen berühren schmerzte, und von ei-  
nem vor 4. Jahren unterdrückten Tripper kam: ein mit  
dem Trippergifte bestrichenen Kerzchen in die Harnröh-  
re gebracht, und durch 7 Stunden darinn gelassen,  
nach welcher Zeit sich der Tripper mit seinen Zufällen

zu

2. Verhärtung der Uterihoden. (*Epididymides*.)

Diese bleibt, selbst nach zertheilter Geschwulst der Hoden durch viele Jahre zurück.

3) Krebsigte H. Man erkennt sie an einem stechenden Schmerze, und einer steinähnlichen Härte der Hode, nach einem veralteten Scirrhus.

Die

---

zu zeigen anfang, den Herr Odentkirchen durch zwey am folgenden Tage eingeschobene frische Kerzchen so sehr vermehrte, daß die Tripperfeuchtigkeit unterbrochen (*rivi instar*) abfloß. Diesen künstlichen Tripper behandelte er dann gehörig, und bemerkte während dem Fortgang desselben eine Anschwellung der Hode: Er machte also eine neue Einimpfung, und wiederholte diese, so oft die erfolgende Wirkung zu Ende gieng, so lange, bis nach 10 Wochen die angeschwollene verhärtete Hode so zertheilt war; daß sie der gesunden durchaus gleich kam. Diesen Versuch hat er in der Folge bey Hodenkrankheiten sehr oft, und immer mit dem besten Erfolge wiederholt. Mit dem Eiter von gutartigen Trippern unternommene Einimpfungen sind selten gelungen, denn in den meisten erfolgte gar kein Tripper, in andern aber nur ein Schleimtripper, von dem die Krankheit nicht im geringsten gehoben wurde. Weil in einer Privatpraxis nicht immer ein Eiter von böartigen Trippern zu haben ist, so hat man auf Anrathen des fürtreffl. und gel. Herrn Dr. Lange, sieben Kerzchen, die mit Baumwolle, und dann mit diesem Trippereiter überzogen waren, in einem wohlverschlossenen Glase durch 4 und 5 Monate aufbewahrt; aber nur eines davon erweckte einen schwachen Tripper, der eine verhärtete Hode nicht vollkommen zu zertheilen fähig war. S. Lange, *Commentatio medico-chirurgica de Ophthalmia*. Tyrnav. 1777 p. 75.

Die Heilungsart erfordert, die Hode auszuschnelden, wenn die Saamenschnüre noch nicht bis zum Schaamweichenring verhärtet gefunden wird.

## Venerische Hodensackgeschwüre.

( *Ulcera venerea scroti.* )

Es sind vom Lustseuchegift entstandene Geschwüre am Hodensacke.

In Absicht auf ihrem Sitz sind sie dreyfach:

1) H. an der Haut, die bloß die Haut angreifen, breit, oberflächlich, im Umkreise roth, in der Mitte unrein sind.

Sie werden durchs Gammiquecksilber leicht geheilet; wobey man äußerlich den Quecksilverbalsam oder die balsamische Quecksilberauflösung anzuwenden hat.

2) In die Hoden eindringende ( *testicularia* ) H. die bis in die Substanz der Hoden selbst eindringen; man erkennt sie durch den Sucher, die vorgängige Entzündung, die Vereiterung der Hode, und den Ausfluß einer weißlichten etwas fäserigten Materie.

Wenn diese immer ausgedrückt wird, so bleibt, nach geheiltem Geschwüre, eine Hodenschwindsucht ( *tabes testiculi* ) bey der die Hode kaum eine Nuß groß ist, zurück.



Die Heilungsart. Ausser dem innerlichen Gebrauche des Quecksilbers, muß man die Substanz der Hode nicht ausdrücken, und sich der Auflösung des Sublimats mit dem Kommenderbalsam äußerlich bedienen.

3) Harntriefende (*urinosa.*) H. die in die Harnröhre dringen, einen oder mehrere, schwämmichte Regel am hintern Theile des Hodensacks bilden; welche roth, schmerzend sind, nach dem Ausflusse des Harns aus der Harnröhre gähe anschwellen, dann aus unzähligen Löcherchen den Harn, unter der Gestalt eines Schweißes aussintern lassen, und dann bald wieder abschwellen. \*)

Die H. H. erfordert, ausser dem innerlichen Gebrauche des Gummiquecksilbers.

1) Ein hohles Kerzchen, welches man mit dem Quecksilverbalsam bestreicht und in die Harnröhre schiebet, um das in dieselbe dringende Geschwüre zu heilen, und zugleich den Ausfluß und die Einsinterung des Harns in die Fächerhaut des Hodensacks zu verhindern.

2) Den schwämmigten Regel am Hodensacke muß man öfters gelinde ausdrücken, mit rothen Präci-  
pi.

---

\*) S. Freyh. van Swieten, 5. B. S. 427.

pitat bestreuen, und sich der balsamischen Quecksilber-  
auflösung beym Verbande bedienen.

---

## Krankheiten der Vorsteherdrüse.

(Morbi glandulae prostaticae.)

### Venerische Entzündung der Vorste- herdrüse.

(Inflammatiö prostaticae venerea.)

**E**s ist eine vom Luftseuchegift erzeugte Entzündung  
der Vorsteherdrüse.

Kennzeichen sind:

1) Die Empfindung einer Schwere, eines  
Brennens und Drückens im Mastdarne. Zuweilen  
schmerzet die ganze untere Schmeerbauchgegend.

2) Der in dem Mastdarm gebrachte Finger fühlet  
ein hartes und hitzendes Knötchen unter dem Hals der  
Harnblase, wenn die Geschwulst sehr groß ist, so fühlt  
man sie auch zum Theile im Mittelfleische.

3) Das Sarnen ist äusserst schwer, und wird  
nach und nach vollkommen unterdrückt.

4) Der Sarnzieher ( catheter ) kann nur sehr schwer, oder gar nicht, in die Blase gebracht werden, und stößt vor dem Halse derselben an ein Hinderniß.

5) Der etwas harte Darmunrath hat ein eingedrücktes Zeichen gleich einem Einschnitte ( crena ); zuweilen ist ein sehr heftiger und beständiger Zwang zugegen, ungeachtet der Unrath ganz flüßig ist.

Diese Entzündung ist sehr gefährlich; denn nicht selten greift sie auch die Saamenbläschen und die ganze Harnblase an, und in dreyen Tagen tödtet sie durch einen Blasenbrand. \*)

6) Zuweilen findet sich dabei auch ein Tripper ein, und zuweilen nimmt das Uebel von einem unterdrückten Tripper seinen Ursprung.

Die Heilungsart erfordert, den Tripper wieder herzustellen, und die Entzündung zu zertheilen. Diese Anzeigen erhält man

- 1) Durch Aderlässe;
- 2) — eine kühlende Saamenmilch;
- 3) — Gummiquecksilberpillen;

4)

---

\*) S. Herrn Dubb, *Medicamenta circa methodum luis venereae curande.* Upsaliae 1777 p. 48.

4) durch Umschläge aus erweichenden Mehlgattungen und Milch ;

5) — in kleiner Menge gegebene Klystire , aus dem Silberglätteessigwasser und erweichenden ( darinn abgekochten ) Kräutern,

### Venerische Eiterbeule der Vorsteherdrüse. ( Abscessus venereus prostaticae. )

Es ist eine Eitergeschwulst der Vorsteherdrüse.

Gattungen sind :

1) Verschlussene E. man erkennet sie

1. An den Zeichen einer vorhergegangenen Entzündung.

2. Durchs Gefühl einer Geschwulst im Mastdar-  
me, die, während dem Entzündungszeitraume hart,  
nun aber weicher und schwankend ist.

3. Durch die leichtere Einbringung des Sarn-  
ziehers.

Die Heilungsart. Wenn sich die Entzündung  
dieser Drüse nicht zertheilen läßt, so muß man



1. sehr erweichende Breymuschläge auf das Mittelfleisch legen, und

2. ähnliche Klystire setzen; findet man nun

3) durch den in den Mastdarm gebrachten Finger, daß die Geschwulst schon weicher und schwankend geworden ist, ohne doch von sich selbst zu bersten; so kann man dieselbe entweder durch einen tief in die Harnröhre geschobenen Harnzieher, oder durch einen krummen, durch den After angebrachten Troikart öffnen.

2) Offene E. Eine Eiterbeule der Vorsteherdrüse pflegt sich auf vier verschiedene Arten zu öffnen:

I. In die Harnröhre; dieß geschieht am öftesten; vorzüglich, gähe während dem Einbringen des Harnziehers:

2. in den Mastdarm, selten:

3. in die Harnblase, zuweilen:

4. in das Mittelfleisch, welches man schon öfters beobachtet hat.

Die geschehene Verftung erkennt man

I. wenn gähe eine große Menge Eiter entweder aus der Harnröhre, oder aus der Blase mit dem Harn,

Harn, oder aus dem After, oder aus der Eiterbeule am Mittelfleische hervor kömmt:

2. Wenn der Harnabfluß nun frey wird, und das Fieber, sammt den übrigen Entzündungszufällen, plötzlich, und vollkommen nachlassen.

Die Heilungsart der offenen Eiterbeule erfordert abwischende, reinigende Einspritzungen durch den After oder die Harnröhre mittelst welcher das offene Geschwür geheilet wird.

Innerlich giebt man das Gummiweissesilber.

## Venerische Verhärtung der Vorsteherdrüse.

( Scirrhus venereus prostaticus. )

Es ist eine vom Lustseuchegift erzeugte Verhärtung der Vorsteherdrüse.

Gattungen sind:

1) Gemeine V. Ihre Kennzeichen sind:

1. Eine vorher gegangene Entzündung der Drüse, die in keine Eiterbeule übergeht;

2. das Gefühl einer harten, kaum schmerzenden Geschwulst im Mastdarne;

3. beschwerliches Sarnen;

4. etwas harter Darmunrath, der das Zeichen eines Einschnittes (crena) in der Mitte hat.

Die Heilungsart erfordert, den Scirrhus zu zertheilen, folglich giebt man

1. Das Gummiquecksilber mit andern auflösenden Mitteln.

2. Die mit der Schweinsbrodsalbe vermischte Quecksilbersalbe wird auf das Mittelfleisch gelegt.

3. In die Harnröhre steckt man Kerzchen. Sollte man etwa auch die Trippereinimpfung versuchen?

4. Entsteht aber eine vollkommene Harnhemmung von der Verhärtung der gesagten Drüse, so zerschneidet man mit dem Steinschnittmesser (lithotomi) die scirrhöse Drüse in der Mitte (corpus) um sie dadurch in Vereiterung zu bringen.

2) Schwammartige B. Diese sonderbare Ausartung dieser Drüse könnte man etwa durch eine sehr genaue Untersuchung der Blase mit dem Harnzieher in Erfahrung bringen. Zur Heilung scheint fast keine Hoffnung übrig zu seyn. Sollte man etwa, nach gemacht,

machtem Blasenschnitte , die Ausschneidung , ober Ab-  
bindung des Schwammes versuchen ? \*)

3) Krebsartige V. Der Schmerz , und die  
übrigen Zeichen des Krebses , an denen man den Uiber-  
gang eines Scirrhus in den Krebse erkennt , zeigen  
zugleich die Gegenwart eines tödtlichen Uibels. Man  
muß eine lindernde Seilungsart ( cura palliativa )  
vorfehren.

## Krankheiten des Mittelfleisches und des Afteres.

( Morbi perinaei et ani. )

### Venerische Fistel des Mittelfleisches.

( Fistula perinaei venerea. )

**E**s ist eine vom Lustseuchegift entstandene Fistel am  
Mittelfleische.

Gat:

\*) Herr Zuber hat im Körper eines siebenzigjährigen Man-  
nes , der im Leben sehr ausschweifend gewesen war , nach  
aufgeschnittener Harnblase einen sehr grossen schwam-  
migten Auswuchs gesehen , der von der Vorsteherdrüse  
entsprang , und fast die ganze Blase , nur den obersten  
Theil ausgenommen , anfüllte. Er war hart bey seinem  
Ursprunge , wurde nach und nach im Fortlaufe weicher,  
und war an keine Seite der Blase angewachsen : er  
trieb



Gattungen sind :

1) In die Harnröhre dringende F. Man erkennt sie, wenn während dem Harnen der Harn aus der Fistel durch viele Löcherchen dringt. \*) Diese Fisteln stellen einen schwämmigten Regel vor, aus dem durch viele Löcherchen der Harn gleichsam durchsintert.

Die Heilungsart erfordert, ausser dem innerlichen Gebrauche des Gummiquecksilbers :

1. In die Harnröhre ein hohles, mit dem Quecksilverbalsam bestrichenen Kerzchen zu stecken, damit der Harn beim Austritte aus der Harnröhre nicht in die Fächerhaut des Mittelfleisches einsintere, und zugleich um das Geschwür in der Harnröhre zu heilen.

2. Auf den fistelhaften Ort des Mittelfleisches wird der rothe Präzipitat eingestreuet, dann legt man den Quecksilverbalsam oder die balsamische Quecksilberauflösung darüber.

2)

---

trieb die Seitenwände des Blasenhalsses auseinander, bekwegen erfolgte während seiner Gegenwart (so verstehe ich das: *sub fungo. v. W.*) ein immerwährender Harnabfluß. Die durchs Lustfeuchgegift immer gereizte Verhärtung der Vorsteherdrüse scheint, gleich andern, mit Gefäßen und Nerven versehenen Theilen in einen Schwamm ausgeartet zu seyn.

\*) E. Heren Zuber, *Diff. de vesicae urinariae morbis Argent.* 1777. p. 58.

2) In die Vorsteherdrüse dringende F. Man erkennt sie an den Zeichen einer vorher gegangenen Entzündung und Vereiterung dieser Drüse, und einer nachfolgenden Eiterbeule am Mittelfleische.

Die H. A. erfordert den innerlichen Gebrauch des Gummiwecksilbers; äußerlich wie in der vorherigen Gattung.

3) In die Saamendrüse dringende F. Man erkennt sie an der vorhergegangenen Entzündung und Vereiterung dieser Drüse, einer nachfolgenden Eiterbeule am Mittelfleische, und am Ausflusse des Saamens.

Die H. A. ist wie bey Kro. 2. doch ist sie schwerer.

### Venerische Afterfistel.

( Fistula ani venerea. )

Es ist eine vom Lustseuchegifte entstandene Fistel im Umkreise des After.

1) Aeußerliche A. die von einer übel geheilten venerischen Blutschwäre, oder einer Feigwärze entsteht, und nicht bis in den Mastdarm bringet.

Die

Die Heilungsart erfordert den innerlichen Gebrauch des Gummiquecksilbers ; äußerlich kann man die balsamische Quecksilberauflösung einspritzen , oder auflegen ; zuweilen wird sie durch den bloßen Quecksilberbalsam geheilet.

2) Innerliche H. Sie entsteht gemeiniglich von einem Geschwüre der Vorsteher- oder der Saamendrüse. Man erkennt sie folglich an der vorher gegangenen Entzündung und Vereiterung dieser Theile, und dem Ausflusse des Saamens, während dem Beyschlase, in den Mastdarm. \*)

Die H. H. Man kann eine Einspritzung der Quecksilberauflösung, und den innerlichen Gebrauch des Gummiquecksilbers versuchen. Wenn die Heilung nicht gelingt, so muß man alle darunter liegende Theile zerschneiden; damit die Arzneymittel an den verletzten Ort, oder den Grund der Fistel, gelangen können.

### Venerischer Afterkrampf.

( *Arctura venerea ani.* )

Es ist eine vom Lustseuchegifte entstandene, unvorhofft kommende (spontanea) Zusammenziehung der Afteröffnung und des Mastdarmes.

Die

---

\*) Sauvages, *Nosol. method.* T. II. p. 411.

Die Heilungsart erfordert

1) die zusammengezogene Oeffnung des Darmes durch ein mit dem Quecksilberbalsam bestrichenen Kerychen zu erweitern; man hat sich dabey nach und nach dicker zu bedienen: innerlich giebt man das Gummi-quecksilber.

2) Wenn dies nicht hinreicht, so muß man kleine Einschnitte ( scarificationes ) an der Afteröffnung vornehmen, und mit dem Kerychen zugleich fortfahren. \*)

### Venerische Feigwärzen. ( Condylomata venerea. )

Es sind schwämmigte, vom venerischen Gift entstandene Auswüchse.

Der gewöhnlichste Sitz derselben ist bey Männern unter der Vorhaut der Eichel, bey Weibspersonen um den After. Indessen findet man sie auch innerhalb den Schaamläszgen, am ganzen Hodensacke, an den Schaamweiz

---

\*) Ich weiß, daß Herr Ritter von Brambilla diese Einschnitte bey einem Manne mit gutem Erfolge gemacht hat. S. auch Freyh. van Swieten Comment. T. V. p. 451. — Herr Scharp sah in 4 Fällen, den Mastdarm um die Afteröffnung so sehr zusammen gezogen, daß der innere Raum des Darmes bey einem von diesen Kranken nicht größer als eine Schreibfeder war. S. Critical Enquir. etc. p. 143.



weichen, im Munde, am Angesicht; einmal habe ich sie sogar fast am ganzen Körper, und auch zwischen den Zehen gesehen.

Es scheint eine Krankheit der durchs Luftseuchegift gereizten, und auswachsenden Hautwärtchen zu seyn.

In Absicht auf ihre Gestalt und Grösse bekommen sie verschiedene Benennungen; z. B.

1) Hennenkammähnliche F. Sie sind den Hennenkämmen, den Hindbeeren, oder Maulbeeren an Gestalt und Grösse ähnlich.

Die Heilungsart. Ausser dem innerlichen Gebrauche des Quecksilbers müssen die Auswüchse täglich zweymal mit dem ägenden Feigwärtzenwasser, oder der starken Auflösung des Quecksilbers im flüssigen Laudanum mittelst eines Pinsels betupft, und alsogleich mit dem Quecksilbersälbchen bedeckt werden. Auf diese Art verschwinden sie in einigen Wochen leicht. \*)

2)

---

\*) Der berühmte Wundarzt, Herr W. Drafé hat durch mehrere Bemerkungen erwiesen, daß die Feigwärtzen auch durch wiederholte Speichelflüsse entweder gar nicht gehoben, oder doch nicht gründlich geheilet werden. S. Mediz. Comment. von ein. Gesellsch. der Aerzte zu Edimb. 4 Th. S. 304. Ich kann aber versichern, daß ich wohl hundertmal eine erstaunliche Menge Feigwärtzen

2) Feigenähnliche F. Sie sind glatt, und an Grösse und Gestalt einer Feige ähnlich. Sie haben einen kurzen dicken Stengel, und werden am besten durchs Abbinden, oder Abschneiden geheilet. Die abgeschnittene Stelle berühre man mit Bleyextrakt damit der Auswuchs nicht wieder nachtreibe.

3) Blumenkohlähnliche F. Sie stellen an Grösse und Gestalt ein Blumenkohlhaupt vor. \*) Auch  
hier

zen nach meiner Methode in 3 oder 4 Wochen vollkommen geheilet gesehen habe. Die Heilung gieng indessen nicht von statten, wenn ich mich des Silberäzsteins, des grünen Vitriols oder der Spießganzbutter an der Stelle des ägenden Feigwurzengewässers bediente. Hr. Gardiener sah so verhärtete Feigwurzengewässer, daß sie von keinem Aegmittel angegriffen wurden; nachdem er sie aber durch eine in Del gekochte Zwiebel erweicht hatte, wurden sie vom aufgestreuten Senvenbaumbblätterpulver hinweg geschafft. S. neue Vor. und Bemerk. ein. Gesellsch. zu Edimb. 3. B. S. 373.

\*) Während ich dieß schreibe, wurde in das Osnerkrankenhaus ein schwangeres Mädchen gebracht, dessen Afteröffnung von einem Gewächse, welches an Grösse einem Kindskopfe gleich kam, und ganz aus sechs Zölle, und darüber langen Feigwurzengewässern bestand, so sehr umgeben war, daß der Stuhlgang dadurch fast unmöglich gemacht wurde. Die Kranke bekam auch den Tag und die Nacht hindurch öfters Zuckungen. Aus dieser Ursache schnitt ich gleich am folgenden Tage den ganzen, der größten Blumenkohlrose ähnlichen Auswuchs  
mit

hier wird zur Seilung das Messer oder die Scheere erfordert.

4) Grükähnliche F. Zuweilen ist die ganze Haut am Hodensack, an den Schaamweichen, oder um den After mit einer erstaunlichen Menge sehr kleiner Wärschen bedeckt; durchs Vergrößerungsglas entdeckt man, wie ich es selbst gesehen habe, das es eben so viele kleine Feigwärschen sind.

Sie werden wie Nro. I. geheilet.

## Krankheiten der Schaamweichen.

### Lustseuchebeulen.

( Bubones venerei. )

Es sind Geschwülste der Schamdrüsen, deren bald eine, bald mehrere sich an eine, oder beyde, Schaamweichen setzen.

Die

mit der Scheere von der Afteröffnung hinweg: der folgende Blutfluß war eben nicht sehr groß; die Zuckungen blieben nach der Operation gänzlich hinweg: durch den innerlichen Gebrauch des Quecksilbers schien sie endlich vollkommen geheilet zu werden; bald darauf aber bekam sie eine Herbsruhr, die eben epidemisch regierte, gebahr, wurde nach der Geburt schlaffüchtig, (roporosa) und starb.

Die Gestalt; sie sind gemeiniglich rund, und länglicht. Die Grösse; sie sind zuweilen klein; zuweilen grösser als ein Taubeney, ein Hühnerey, oder auch grösser als eine Faust.

Bei Säugammen, die ein venerisches Kind stillen; setzen sie sich unter den Achseln an. Einmal habe ich eine solche Beule in der Schaamknochengegend gesehen. Bei Kindern, die von venerischen Säugammen gestillt werden, nehmen diese Beulen die Unterkinnbackendrüs- sen ein, oder verursachen venerische Kropfgeschwülste.

In Absicht auf ihr Entstehen, kann man sie in vier Gattungen eintheilen.

1) Tripper L. Man bemerkt sie sehr oft im Entzündungszeitraum beim Tripper; wo sie dann bei der Abnahme der Entzündung der Harnröhre wieder von sich selbst verschwinden. Diese Gattung scheint von der blossen Entzündung der Harnröhre durch die Mitempfindung der Nerven zu entstehen.

Die Heilungsart der Mitempfindungslustseu- chebeulen erfordert antiphlogistische Mittel.

2) L. von einer örtlichen Ansteckung. Diese Gattung entsteht von dem venerischen Gifte beim unterdrücktem oder sparsam fliessenden Tripper; öfters aber von einem ausgetrockneten Geschwürchen an der



Eichel, oder an der Vorhaut; in welchen Fällen das Miasma mittelst der lymphatischen Gefäße in die Schamweichendrüsen gebracht wird.

3) L. von einer allgemeinen Ansteckung. Diese Gattung findet sich bey der schon allgemein gewordenen Lustseuche ein.

4) L. von der verborgenen Lustseuche. Zuweilen brechen, ohne andere Zeichen der Lustseuche, wegen dieser verborgenen Krankheit, Schambeulen hervor. \*)

In Absicht auf ihre Natur können sie in folgende Gattungen eingetheilt werden.

1) Entzündungsartige L. Sie sind roth, hitzend, schmerzend, etwas hart, und wachsen zur Grösse eines Hühnerenes an. Sie können kaum zertheilt werden, und gehen gemeiniglich in Eiterung über.

Die Heilungsart. Bey ihrem entstehen bedeckt man sie mit einem auflösenden Breiumschlage aus erweichenden Mehlgattungen (farinis) die in Wasser gekocht werden; oder mit einem Liniment aus Honig und der Alraunwurzel. Innerlich giebt man die Gummi-

---

\*) Herr Sauvages bemerkt *Nosol. method. T. II. p. 549.* daß nach dem Gebrauch der Abkochung der Bittersüßstengel (*Scipit. dulcamara*) zuweilen vorhin verborgene venerische Beulen hervor gelodet werden.

miquedfilberpillen, und alle dritte Tage ein abführendes Mittel. Die Diät muß antiphlogistisch seyn.

2) Vereiternde L. Wenn Tro. 1. durch die eben gesagte Methode nicht zertheilt werden kann; so muß man mit dem Schleimpflaster, der Basilikonsalbe, und einem erweichenden Breiumschlag die Vereiterung befördern. Die Diät soll etwas reichlicher seyn, als bey Tro. 1. wenn man in der Geschwulst ein Schwanken vermerkt, muß man sie eröffnen.

Kann man auch durch diese Methode kein vollkommenes Schwanken erhalten, so legt man ein Stückchen Silberäpflein, in der Größe einer Linse, durch eine, oder zwei Stunden, mitten auf die Beule; den eingefressenen Schurf bedeckt man dann mit der Basilikonsalbe, die man vorher mit der Quecksilbersalbe (*unguent. neapolitan.*) vermischt hat, und mit einem erweichenden Breiumschlage: auf diese Art leeret sich die Beule unmerklich aus, und verschwindet nach und nach. Innerlich fährt man mit dem Gebrauche der Gummiuecksilberpillen fort. \*)

F 3

3)

---

\*) Auf diese Art habe ich viele, durch das Quecksilberpflaster, oder die Quecksilbersalbe, oder andere Mittel nicht zu zertheilende Lustseuchebeulen sehr glücklich in 3 - 4 Wochen geheilet. Zuweilen habe ich schon in einer halben Stunde, und noch eher, den Aetzstein hinweggenommen, und es war auch nur ein kleiner eingefressener Schurf zur Heilung hinreichend. Der Schmerz vom

3) Verhärtete L. Man erkennt sie an ihrer Härte, und am Mangel des Schmerzes. Zuweilen sind sie so hartnäckigt, daß sie sich durch keine Mittel, weder zertheilen, noch vereitern lassen.

Die Zertheilung versuche man durch den innerlichen Gebrauch des Gummiuecksilbers, des Guajakgummi, des Extracts vom Gottesgnadenkraute, und durch andere zertheilende Mittel. Außerlich legt man die Quecksilbersalbe mit in gleicher Menge begemischter Schweinsbrodsalbe (*unguentum de arthanita*), und dem Alraunwurzelpulver auf. Zuweilen hat eine Bähung aus der wässerigten Auflösung des Quecksilbers Nutzen geschaff.

Sollte sich eine solche verhärtete Beule durch kein Mittel zertheilen, durch keine erweichende Arneyen in Vereiterung bringen lassen, so muß man sich des Silberätssteins, wie bey Tro. 2. bedienen.

4)

---

vom Aetzstein war nicht groß, der Ueberrest der Beule gieng allmählich in Eiterung über und verschwand: niemals erfolgte ein bösesartiges Geschwür daraus. Wenn aber, wie Viele zu thun pflegen, ein größeres Stückchen Aetzstein durch 12 und mehrere Stunden auf die Beule gelegt wird, so werden Schmerzen, Entzündung und ein Fieber verursacht; zuweilen wird die Beule hierauf gar brandigt, gemeiniglich geht sie aber in ein großes, um sich freßendes, sehr schwer zu heilendes, zuweilen auch in einen wahren Krebs ansartendes Geschwür über; wie ich es sehr oft, hauptsächlich in der faulartigen Luft der Krankenhäuser bemerkt habe.

4) Wasserschwülstige L. Zuweilen schwillt eine verhärtete Lufteuclidean in einem grossen Umkreise wasserschwülstig an, und behält vom Drucke des Fingers ein Grübchen zurück.

Die Heilungsart erfordert eine zertheilende gewürzhafte Bähung, und wiederholte abführende Mittel, ausser dem innerlichen Gebrauche des Quecksilbers.

5) Brandigte L. Die Lufteuclidean gehen bey Etorbutischen, Faulsäftigen, in einem Krankenhausdunstreise zu Bette Liegenden; oder wenn man ein allzu breites Aelmittel aufgelegt hat, zuweilen in den Brand über.

Die Heilungsart. Man hat sich inn- und äusserlich antiseptischer Mittel, der Fiebereinde, des Kampfers, des Mosverleyes, zu bedienen.

6) Verschwürende L. Aus Lufteuclidean entstandene Geschwüre sind zuweilen unbedeutend, und werden durchs Geschwürakwasser (*aqua phagadenica*) oder den Quecksilberbalsam leicht geheilt. Zuweilen hingegen greifen sie weit um sich, verursachen starke Schmerzen, werden auswüchsig (*papillosa*) weichen auf kein Arzneymittel, und zeigen sich krebsartig.

Die H. N. Man muß innerlich das Gummi-quecksilber mit der Fiebereinde geben. Aeusserlich hat



die balsamische Quecksilberauflösung, und wenn schwämmichtes Fleisch da ist, der rothe Präcipitat genügt. Es wird auch die angebrachte fire Luft gerühmt.

7) Fistelartige L. Eine vereiternde Beule bekommt hier und dort Löcherchen, und, sich selbst überlassen, an einer, oder mehreren Stellen, zuweilen tief eindringende Fisteln.

Die Heilungsart erfordert, die Fistelgänge zu eröffnen; übrigens verfährt man, wie bey No. 6.

8) Krebslichte L. Durch viele Jahre sich selbst überlassene, oder mit unschicklichen Arzneyen behandelte Lustseuchbeulen arten in wahre scirrhöse, oder schwämmichte Krebsgeschwüre aus. \*) Die balsamische Quecksilberauflösung verschafft bisweilen grossen Nutzen.

Die

---

\*) Bey einem Manne, der schon durch 17 Jahre eine venerische Beule in der Schaamweiche gehabt hatte, wurde die Geschwulst gähling so groß, daß sie, als ich ihn sah, grösser als 3 Fäuste, anbey auch schmerzend, sehr hart und ungleich war. Der Kranke starb endlich an der Auszehrung. Herr Pietschen sah aus einer venerischen Beule einen krebslichten Schwamm zu einer Grösse eines Hutbodens (pilei caput) gähling anwachsen, und dem Kranken das Leben rauben. Geschichte praktischer Fälle vom Gicht und Podagra. 6. Th. S. 3.

Die Heilungsart. Wenn sichs hoffen läßt, daß die ganze Masse vollkommen ausgerottet werden könne, muß man den Krebs mit dem Messer ausschneiden.

## Venerische Fettverhärtung im Unterleibe, ( *Physonia venerea abdominis.* )

Es ist eine vom Lustseuchegift entstandene Verhärtung des unter der Haut liegenden Fettes im Unterleibe.

Die Heilungsart. Man giebt innerlich Quecksilber, und schmiert die Verhärtung öfters mit der Quecksilbersalbe ein. \*)

## Venerische Hautkrankheiten.

### Venerische Flecke. ( *Maculae venereae.* )

Es sind rothgelbe, kreisförmige, wenig erhabene, mit einem weißlichten Rande umgebene, vom Lustseuchegift entstandene Flecke.

F 5

Am

\*) Bey einem Venerischen war der Unterleib erstaunlich angeschwollen, und das unter der Haut liegende Fett verhärtet. Durch die Speichelfur (hydrargyrosis) aber, und nach siebenmaliger Einreibung mit der Quecksilbersalbe, verschwand die Anschwellung wieder. Sauvages, *Nosol. meth. T. II. p. 490.*

Am öftesten kommen sie an der Stirne hervor, wo sie den sogenannten venerischen Kranz bilden. Nicht selten findet man sie im Angesicht, am Vordertheile der Brust, und zwischen den Schultern; zuweilen auch fast am ganzen Körper.

Sie sind sehr juckend, zuweilen klein, wie die Leberflecke, zuweilen auch sehr breit. Bey Kindern, die von einer venerischen Mutter gebohren worden sind, brechen sie bald nach der Geburt um den After, und den Umfang der Geburtstheile zuerst hervor.

Die Heilungsart erfordert innerlich das Gummiquicksilber, äußerlich das Geschwürähwasser, oder eine Quicksilberauflösung, mit denen man sie waschen muß.

### Venerische Krätze.

( Scabies venerea. )

Es sind harte, rothe, an der Spitze eiternde, räudigte Knötchen, die mit venerischen kupferfarbigen Flecken begleitet, an der Stirne oder andern Theilen des Körpers hervorkommen.

Die H. A. ist wie beyhm venerischen Flecken.

## Venerische Hautschunden.

( Rhagades venereae. )

Es sind trockene und tiefe Hautspaltungen, die man um den After, die Oeffnung der weiblichen Scham, zuweilen auch in der flachen Hand, und an den Sohlen der Füße antrifft.

Sie werden sehr schwer geheilet. Innerlich muß man das Gummiquicksilber, äußerlich die gesättigte Auflösung des ägenden Sublimats, und eine Pomade aus dem weissen oder rothen Präzipitat gebrauchen.

## Venerische Eiterflecke.

( Psylodracia venerea. )

Es sind rothe, sehr erhabene, bald in Hautgeschwüre übergehende Flecke.

Am öftesten findet man sie an den Beinen, und um den Vorderarm, zuweilen um den After und die Geburtstheile.

Selten findet man sie lange ohne eine Verschwürung; folglich muß man sie ohne Verzug, außer dem innerlichen Gebrauche des Quicksilbers, mit der Mercurialsolution öfters waschen.



## Venerische Flechte.

(Herpes venereus.)

Es ist ein rother Fleck, voll kleiner Knötchen oder Bläschen, die sich am Ende abschuppen. Gewöhnlich setzen sie sich an die Ohren, und den behaarten Theil des Kopfes, zuweilen auch an die Brust, und an andere Theile des Körpers.

Die Heilungsart erfordert innerlich das Gummi-quecksilber mit dem Decoct von Bittersüß, (dulcamara) äußerlich nützt es, den Theil mit dem Geschwürakwasser oder der Sublimatauflösung zu waschen. \*)

## Venerischer Kopfgrind.

(Tinea venerea capitis.)

Es ist eine Anhäufung trockner, weißer oder grünlicher Krusten, die man an dem behaarten Theile des Kopfes, zuweilen auch um die Stirne, und die Schläfe, bey venerischen Personen antrifft.

I)

---

\*) Auf diese Art habe ich selbst eine Weibsperson, welche viele, einer Hand breite Flechten an der Brust, an den Armen, und an den Schenkeln hatte, geheilet. Beispiele der Flechten vom verborgenen Lustseuchegift erzählt Herr Faber, Vol. I. p. 289. und 332. S. auch Herrn Schmuckers chirurgische Schriften, I. B. S. 166.

1) R. von der allgemeinen Lustseuche. Er ist mit venerischen Flecken und andern Zeichen der Lustseuche zugleich verbunden.

Die H. M. erfordert den innerlichen Gebrauch des Gummiquedcksilbers. Aeußerlich streicht man den Quedcksilverbalsam behutsam hier und dort an den angesteckten Theil. Im eingewurzelten Uebel habe ich nützlich befunden, den Theil mit dem Geschwürwasser, oder mit der Sublimatauflösung zu waschen.

2) R. von der verborgenen Lustseuche. Bey von venerischen Müttern gebohrnen, oder durch venerische Säugammen gestillten Kindern; ohne ein anders gegenwärtiges Zeichen der Lustseuche.

Die Heilungsart ist wie bey N. I. \*)

Ve:

---

\*) Der berühmte Schiffsarzt Herr Kochler sah, da er zu Neapel das Krankenhaus für grindigte Kinder besuchte, daß unter 400 Kindern 283 von Aeltern, die am nämlichen Orte mit venerischen Krankheiten behaftet zugegen waren, gebohren waren. Der berühmte Leibarzt Herr Rosenstein ist auch der Meynung, der Kopfgrind, der durch Rämme oder Mägen auf Andere fortgepflanzt wird, sey venerischer Art; denn er hat durch den äußerlichen und innerlichen Gebrauch des van Swietenischen Merkuriälgeistes die ärgsten Kopfgrinde geheilet. S. Anweisung zur Kenntniß und Kur der Kinderkrankheiten, S. 662. Ich habe ebenfalls mehrere Kinder und Erwachsene, die mit dem Grinde behaftet waren

## Venerischer Haarausfall.

( Alopecia venerea. )

Es ist ein Ausfall der Kopfs Haare , oder aller übrigen Haare über den ganzen Körper.

Zuweilen fallen die Haare an den Augenbraunen , den Augenliedern , und der Schamgegend von dem Lustfeuchegift aus.

Die Heilungsart. Wenn die Haarzwiebeln vom Lustfeuchegift schon verdorben sind , so wachsen die Haare , auch nach geschehener Heilung der Seuche , nicht mehr nach.

## Venerisches Verderbniß der Nägel.

( Unguium corruptio. )

Es ist ein verschwürendes Verderbniß eines oder mehrerer Nägel.

Ofters bemerkt man diesen Fehler an den Füßen , als an den Händen. Zuweilen kommt es von der allgemeinen , zuweilen von der verborgenen Lustseuche \*):

Die

---

ren , durch den innerlichen Gebrauch des Summiqued-silbers , bald mit , bald ohne Abwaschung des Kopfes mit der wässerigten Quecksilberauflösung glücklich geheilet.

\*) Bernardinus Tomitanus , der beyläufig hundert Jahre nach dem ersten Entstehen der Lustseuche lebte , schrieb : „ Vi-  
„ dit

Die Heilung geschieht durch den innerlichen Gebrauch des Gummiquicksilbers, wenn zugleich äußerlich die Auflösung des ätzenden Sublimats mit dem mis Mastix versetzten Weingeiste gebraucht wird.

## Venerisches Jucken.

( Pruritus venereus. )

Es ist eine vom Lustseuchegift entstandene, zum Kraken nöthigende Empfindung.

1) Jucken der Geburtstheile. Nach einem unreinen Beyschlase findet sich bey Männern am Kopfe der Ruthe, bey Weibspersonen in der Schamhöhle, zuweilen ein so heftiges Jucken ein, daß sie sich mit den Nägeln die Haut beynähe abstreifen: es hält durch viele Tage an.

Die Heilungsart. Man muß den juckenden Ort mit der Quecksilberauflösung waschen, oder mit der Quecksilbersalbe bestreichen.

2)

---

„ dit aetas proxime acta, in multis fieri dentifluvium  
 „ parcius nunc id videmus; ac multo saepius, cadere  
 „ supercilia, capillos et barbam experimur. „ Anton  
 Musa Brassavolus bemerkt, es wären bey Venerischen  
 die Nägel abgegangen, und die Haare sammt den Zäh-  
 nen ausgefallen. S. Freyh. van Swieten Comment. T.  
 V. p. 406.



2) *F.* des ganzen Körpers. Vor und während dem Ausbruche der venerischen Flecke, oder des venerischen Friesels bemerkt man, vorzüglich gegen den Abend, zuweilen am ganzen Körper ein starkes Jucken.

Die *H. M.* erfordert den innerlichen Gebrauch des Gummiquicksilbers; äußerlich Bäder, und eine Abwaschung mit der Quecksilberauflösung.

### Venerischer Ausatz:

( *Laepra venerea.* )

Wenn die Haare ausgefallen sind, und die Haut am Angesicht und an andern Theilen mit Hautschunden, Beulen und Nauden verunstaltet ist, so ist der venerische Ausatz zugegen. \*)

Die

---

\*) Herr Raymond erzählt im *Traité des maladies qu'il est dangereux de guérir*, p. 357. folgende Bemerkung: Ein fünfzigjähriges Weib hatte mehr als gewöhnlich vorstehende, rothe Augen, mit einem schwachen Gesichte, keine Augenbräune, dicke angeschwollene Lippen, eine schwache heischere Stimme, eine platte Nase; weit offenstehende Nasenlöcher, mit einer sinkenden, aus denselben triefenden Feuchtigkeit, eine runzlichte Stirne, einen ganz kahlen Kopf, mehr als gewöhnlich dicke Ohrenlappchen, eine ganz haarlose, glänzende, dicke, rauhe, ungleiche, an mehreren Orten verhärtete Haut, einiges Jucken über den ganzen Körper, einem bösen Athem mit einer Schwere des Kopfes, und einem harten Gehör. Ihr Ehemann hatte die Lustseuche gehabt, und bloß diese Quelle konnte man über das Entstehen der  
bis

Die Heilungsart erfordert, ausser dem innerlichen Gebrauche des Quecksilbers, den ganzen Körper mit der Quecksilberauflösung zu waschen: der wahre Ausfatz hingegen wird durchs Quecksilber nicht geheilet, \*) sondern vom *ledo pallustri*.

Des

---

bis ist beschriebenen Krankheit angeben, man nahm also die Speichelfur (*hydrargyrosis*) vor, und durch diese wurde die Kranke in Zeit von 2 Monaten vollkommen geheilet; die Haut wurde wieder weich, die Haare wuchsen nach, das Gesicht und das Gehör erhielten wieder ihre Schärfe. — Auch scheint die Sattung des Ausfazes, die man im Florentinischen Krankenhause zum S. Eusebius durch den äusserlichen Gebrauch des ägenden Quecksilbersublimats heilet, venerischer Natur zu seyn. S. *Dissert. sopra le malattie, che si curano nel regio spedale di S. Eusebio in Firenze. 1771.*

- \*) Nichts ist gewöhnlicher, sagt Herr Schilling in seinem fürtrefflichen Werke *de lepra* S. 39 u. 40. als die Vermischung des Ausfaggiftes mit dem venerischen. Denn Ausfäzige sind sowohl im Anfange, als im Fortgange der Krankheit ausserordentlich zum Benschlase geneigt. Durch diesen Reiz angetrieben, vermischen sie sich mit verschiedenen Personen, und sehr oft; auf diese Art theilen sie aber das Ausfaggift Andern mit, und werden wieder im Gegentheile von Andern mit dem Lustseuchegift angesteckt. Unter die Zufälle dieser mit einander verbundenen Gifte gehören nun vorzüglich krebstartige, allen Arzneien widerstehende Geschwüre der Schaamtheile. Herr Schilling hat in diesem das Quecksilber versucht, aber immer böse Wirkung davon gesehen. Vielfältige Erfahrungen haben ihn gezeigt, daß das Quecksilber zur Bändigung des Ausfaggiftes ganz

un-

## Venerische Hautgeschwüre.

( *Ulcera venerea cutis.* )

Es sind bloß die Haut angreifende, gemeiniglich runde, scheckigte Geschwüre mit weichen und rothen Rändern.

Wenn sie breit sind, kommen sie dem venerischen Krebse sehr ähnlich, nur sind bey jenen die Ränder weich und röthlicht, bey krebfigten Geschwüren sehr hart, und bleich. \*)

1) B. von der allgemeinen Lustseuche. Sie erfolgen nach vorher gegangenen Eiterflecken (*psudra-cia*) oder venerischen Eiterbläschen: man erkennt sie leicht an den vorher gegangenen oder noch gegenwärtigen, venerischen Zufällen.

Die

---

untüchtig sey; daß es den Ausfag schlimmer mache, und gemeiniglich eine höchst faulartige Ruhr erzeuge. Es glauben noch einige Schriftsteller, der Ausfag der Alten wäre die Lustseuche selbst gewesen, oder diese wäre vom Benschlase mit einer Ausfagigen entstanden; aber der wahre Ausfag steckt die Geburtsglieder nicht an; er wird auch durchs Quecksilber nicht geheilet, und er war endlich, lange bevor man von der Lustseuche etwas wußte, den Aerzten schon bekannt.

\*) Kirchen, von den Kennzeichen der Krebschäden. S. 81

Die Heilungsart erfordert innerlich das Cambriguequeßilber; äußerlich den Quecksilverbalsam, oder die Quecksilberauflösung.

2) B. von der verbergenen Lustseuche. Sie entstehen, ohne vorher gehendes Zeichen der Seuche, von dieser, wenn sie entweder angebohren, oder überkommen, und übel geheilt worden ist. Durch eingekreueten versüßten Quecksilbersublimat werden sie rein gemacht, wenn sie venerisch sind; dieß erfolgt aber nicht, wenn sie ihr Daseyn irgend einer andern Ursache zu verdanken haben. \*)

## Venerische Augenkrankheiten.

(Morbi venerei oculorum.)

### Venerische Augenentzündung.

(Ophthalmia venerea.)

Es ist eine vom Lustseuchegifte entstandene Röthe und Schmerz an den Augen.

Gattungen sind:

1) Tripperartige A. Es ist eine heftige Augenentzündung, die in Mannspersonen vom unterdrück-

§ 2

ten

\*) Rosenstein, a. O. S. 674.



ten Tripper, bey Frauenzimmern aber vom unterdrückten weissen Flusse entsteht. Die Ursache ist eine Absetzung der Trippermaterie aus der Harnröhre in die Fächersubstanz, welche die Oberfläche oder die weisse Augenhaut des Augapfels, und der Augenlieder überzieht.

**Erkenntniß.** Zween oder drey Tage nach unterdrücktem Tripper entsteht ein sehr häufiger Abfluß einer eiterförmigten, weißgelblichten, und der, vorhin aus dem männlichen Gliede triefenden, vollkommen ähnlichen Feuchtigkeit aus dem rothen Auge. Die Röthe der Augen geht fast immer in eine so heftige Entzündung über, daß dadurch die Hornhaut verdunkelt wird, und wegen der erstaunlichen Anschwellung der weissen Augenhaut, wie in einer Grube versenkt zu seyn scheint.

Gemeiniglich endet sich diese Augenentzündung in eine Vereiterung und Verschwörung der Horn- und weissen Augenhaut, nach welchen eine Verdunklung der erstern, oder ein Eiterauge, oder eine unheilbare Blindheit wegen der Zerstörung der innern Theile des Augapfels zurück bleibt. \*)

Die Heilungsart erfordert, gleich beyim Anfange der Entzündung des Auges.

I.

---

\*) Camerarius *Dissert. de Ophtalm. venerea*, 1734. Bowley *on the diseases of the eyes*, Lond. 1773. und Herr Schmu-  
cker chirurg. Wahrnehm. 1. Th.

1. Die Ader zu öffnen, und ein antiphlogistisches abführendes Mittel zu geben;

2. Innerlich täglich GummiQuecksilber auf 30 Grane;

3. Ist das entzündete Auge stündlich mit der Quecksilbermilch, oder mit einer sehr schwachen Quecksilberauflösung, mittelst eines Augenbadschälchens, oder eines andern tüchtigen Gefäßchens, zu baden.

Bloß nach dieser Methode habe ich Viele glücklich geheilet, und die Blindheit verhütet.

Die bis ist gewöhnliche Heilungsart erforderte Aderöffnungen, an die Augenwinkel gesetzte Saugwürmer (*hirudines*,) Blasenpflaster, Fontanelle, achttägige Abführungen, auf das Auge gelegte zertheilende Breiumschläge, und erweichende Bäder des männlichen Gliedes, um den Tripper wieder zurück zu bringen. Das Augenschröpfen (*ophthalmomyia*) und das Ausschneiden der weissen Augenhaut haben nichts genützt. Ich habe gesehen, daß Viele auf diese Art blind gemacht worden sind.

Es steht zu versuchen, was die, mittelst eines mit bössartigen Trippereiter bestrichenen und in die Harn-

röhre geschobenen Rerzhens , gemachte Trippereinimpfung bey dieser Krankheit wirken würde. \*)

2) H. von der allgemeinen Lustseuche. Diese Gattung entsteht von der durch den ganzen Körper verbreiteten Lustseucheschärfe. Die Rörhe ist langwährig , aber nicht so heftig wie bey der vorigen Gattung ; um den Tagesanbruch läßt diese Gattung nach , sie geht auch niemals , wie die vorige , in die heftige Augenentzündung ( chemosis ) über.

Die Heilungsart erfordert den innerlichen Gebrauch des GummiQuecksilbers ; äußerlich ein Augenbad aus der Quecksilbermilch oder dem Quecksilberaugenbalsam. Der Pappelabsud , von welchem man in einem  
Pfund

---

\*) S. Herrn Lange *Comment. de ophthalmia*, p. 75. Hier geschah vor kurzem ein seltner Fall dieser Krankheit. Ein Rätzischer Fleischer hatte den Tripper ; diesen zu heilen , nahm er einige Unzen Terpentindöl. Der Tripper wurde unterdrückt ; es erfolgte aber gähe eine heftige tripperartige Augenentzündung an beyden Augen. Der Wundarzt wollte , nachdem er mich über diesen Fall befragt hatte , die Trippereinimpfung vornehmen ; der Kranke ließ es aber nicht zu , und sagte , er wollte wohl auf einem gelindern Wege den Tripper wieder herstellen. Zu diesem Ende gieng er zu der nämlichen Weibsperson , von welcher er den vorigen Tripper bekommen hatte , und am folgenden Tage hatte er ihn schon wieder im höchsten Grade , die Augenentzündung nahm nun ab , und durch den bloßen innerlichen Gebrauch des GummiQuecksilbers , waren beyde Krankheiten in sechs Wochen vollkommen geheilet.

Pfunde ein Gran ähnden Sublimat auflösen ließ, hat zuweilen bald geholfen.

## Venerisches Augenliedereitertriefen.

(Lippitudo venerea.)

Es ist ein Ausschwißen einer eiterförmigten Feuchtigkeits aus den Augenliederrändern.

Gattungen sind :

1) M. vom unterdrückten Tripper, oder weissen Flusse. Diese Gattung geht der künftigen tripperartigen Augenentzündung vor; zuweilen bleibt sie aber langwählig.

Die H. M. erfordert, außer dem innerlichen Gebrauche des Gummi-Quecksilbers, den rothen Augenbalsam, oder die Quecksilberauflösung wie ich kurz vorher, bey der venerischen Augenentzündung von der allgemeinen Lustseuche angerathen habe.

2) M. bey neugebohrnen Kindern. Von venerischen Müttern gebohrne Kinder bekommen einige Wochen nach der Geburt eine Anschwellung der Augenliederränder; bald hierauf fließt eine grosse Menge eines weißgrünlichen Eiters, wie bey dem Tripper, aus der Harnröhre, aus den Augen; die Entzündung der Augen ist zuweilen gering, zuweilen auch heftig. Dieses



Eitertriefen ist ein Hauptkennzeichen der verborgenen Lustseuche bey dem Kinde ; öfters erfolgt es ohne irgend einen andern venerischen Zufall , und geht , wenn sie übel geheilet wird , in die ärgste Augenvereiterung und in Blindheit über.

Die Heilungsart erfordert die nämliche Methode, wie No. 1.

### Venerische Flecke der Hornhaut.

( *Macula corneae venerea.* )

Es ist eine vom Lustseuchegifte entstandene Farbveränderung an der Hornhaut.

Zuweilen ist nur ein Theil derselben , zuweilen aber ist sie durchaus verdunkelt.

Gattungen sind :

1) F. von einer vorhergegangenen venerischen Augenkrankheit ; z. B. nach einer Augenentzündung, dem Augenliedereitertriefen , oder einem venerischen Hornhautgeschwür.

Die Heilungsart erfordert den innerlichen Gebrauch des Gummiquedksilbers : äußerlich muß man den Flecken , oder die verdunkelte Hornhaut täglich zweymal mit der Quecksilberauflösung mittelst eines Pinsels

fels berühren, hierauf täglich dreyimal mit dem rothen Augenbalsam \*) einer Linse groß, den Flecken bestreichen. \*\*)

2) F. von der verborgenen Lustseuche bey neugebohrnen Kindern. Neugebohrne Kinder einer mit dem venerischen weissen Flusse angesteckten Mutter, bekommen öfters Hornhautverdunklungen und Augapfelschwindsucht.

Wenn man die bey der vorigen Gattung angerühmten Mittel, gleich bey'm Anfange der Krankheit, zur Heilung versucht, so hat es öfters glückliche Folgen gehabt.

### Venerische Hornhautgeschwüre.

( *Ulcus venereum corneae.* )

Es ist ein vom Lustseuchegifte entstandenes Geschwür an der Oberfläche der Hornhaut.

§ 5

Gat.

\*) Volger, *Diff. de maculis corneae*, Goetting. 1778. p. 16. und Theden, *Bemerkungen*, 1771. S. 192.

\*\*) Der Freyherr van Swieten hat bloß durch den innerlichen Gebrauch des ähnden Quecksilbersublimats Hornhautflecke geheilet. *S. Mediz. Bemerk. einer Gesellsch. von Aerzt. in Lond.* 3, B. S. 206.

Gattungen sind :

1) H. von einer venerischen Augenkrankheit,  
2. B. von einer vorher gegangenen , oder noch gegen-  
wärtigen , tripperartigen oder venerischen Augenentzün-  
dung. \*)

Die Heilungsart erfordert, ausser dem innerli-  
chen Gebrauche des Gummiquicksilbers, äusserlich den  
Quecksilberaugenbalsam, und die schwache Quecksilber-  
auflösung mit Rosenhonig.

2) H. von der verborgenen , oder von der  
allgemeinen Lustseuche. In beyden Fällen hat man  
zuweilen Hornhautgeschwüre gesehen.

Die H. A. ist wie bey Kro. I.

### Venerisches Literauge. (Hypopyum venereum.)

Es ist eine Eiteransammlung in der vordern Augen-  
kammer.

1) E. vom unterdrückten Tripper. Diese Gat-  
tung habe ich ohne eine beträchtliche Augenentzündung  
ge-

---

\*) Janin Abh. über das Auge und dessen Krankheiten.  
S. 317. 4. Beobacht.

gesehen. Abführende Arzneyen sammt einer Bähung aus dem Pappelfrautabsude, und der beygemischten Quecksilbermilch haben Ruken geschafft.

2) E. von einer heftigen venerischen Augenentzündung. Wenn die Hornhaut von dem in den Augenkammern gesammelten Eiter ausgefressen wird, und endlich berstet, so fließen die vom Eiter aufgelösten Augensäfte aus, und es erfolgt eine Augapfelschwindelsucht, und eine unheilbare Blindheit.

Die Heilungsart des anfangenden Eiterauges ist wie bey der tripperartigen Augenentzündung.

### Venerische Thränenfistel.

(Fistula lachrymalis venerea.)

Es ist ein von dem in die Thränenfackdrüsen abgesehnen Lustfeuchte entstandener Ausfluß einer eiterförmigen, aus den Thränenpunkten auszudrückenden Flüssigkeit.

Gattungen sind:

1) E. von unterdrücktem Tripper. Die Heilung geschieht durch das innerlich gegebene Gummi-quecksilber. Außerlich muß man sich der sehr schwachen wässerigten Quecksilberauflösung bedienen. Zuwei-  
len



ten entsteht eine solche Fistel von der verborgenen Lustseuche. \*)

2) E. von einer Knochenzerfressung des Thränenknochens. Diese Gattung ist sehr böse: die H. A. erfordert, außer innerlich zu gebenden Quecksilberarzneien, die balsamische Quecksilbersolution mit dem man die Knochenzerfressung berührt.

### Venerische Knötchen der Augenlieder.

(Hordeolum venereum.)

Es sind rothe, einer kleinen Blutschwäre ähnliche, vom Lustseuchegifte entstandene, Beulchen, oder Knötchen an den Rändern der Augenlieder.

Die Heilungsart erfordert innerlich das Gummi-quecksilber, äußerlich die Quecksilbermilch.

### Venerischer Staar.

(Cataracta venerea.)

Es ist eine von der, durchs Lustseuchegift verursachten, Undurchsichtigkeit der Krystalllinse entstandene Blindheit. Gat=

---

\*) S. Rosenstein, von Kinderkrankheiten, S. 643. und Fabre, *Traité des maladies veneriennes*. T. I. p. 12. — Serr Petit hat eine Thränenfistel in beyden Thränensäcken, und ein, von der verborgenen Lustseuche entstandenes Gaumengeschwür durch Quecksilbereinreibungen geheilet.

Gattungen sind :

1) St. vom gehemmten Tripper. Zuweilen entsteht , ohne eine vorhergängige Augenentzündung , der Staar. In zweenen Fällen habe ich aber nach einer geheilten tripperartigen Augenentzündung eine zurückbleibende Undurchsichtigkeit der Krystalllinse gesehen.

Die Heilung kann man mittelst des innerlichen Gebrauches des GummiQuecksilbers , oder des versüßten Quecksilbers versuchen ; wenn dieß nichts hilft , so unternehme man die Staarausziehung \*)

## Venerischer schwarzer Staar.

( Amaurosis venerea. )

Es ist eine vom Lustseuchegifte entstandene Blindheit , ohne einen im Auge zu entdeckenden Fehler.

Gat.

\*) Ein geschickter Soldatenwundarzt berichtete mir , er habe bey einem Soldaten den vom gehemmten Tripper entstandenen Staar durch die GummiQuecksilberpillen geheilet. — Herr Sauvages sagt , der venerische Staar würde durch den Sublimatgeist zuweilen gehoben. — Ich habe beyde Mittel beym venerischen Staar vergeblich versucht.

Gattungen sind :

1) *S.* von einem unreinen Beyschlafe: man hat sie bald nach dem Beyschlafe entstehen gesehen \*)

Die Heilungsart erfordert, sogleich ein abführendes Mittel und das GummiQuecksilber.

2) *S.* von der allgemeinen Lustseuche. Diese Gattung ist mit Schmerzen im Auge und Schlaflosigkeit verbunden. Die von einem den Gesichtsnerven drückenden Knochenauswuchse, oder von venerischen Wasserbläschen an der Markhaut oder dem Gesichtsnerven entspringende Gattung wird, nach dem Berichte der Schriftsteller, durch den Speichelfluß geheilet. \*\*)

Innerlich kann man das GummiQuecksilber oder den ägenden Sublimat mit dem Seidenbastabsude versuchen.

Des

\*) Jacutus sah wenige Stunden nach einem unreinen Beyschlafe den schwarzen Staar mit Geschwüren und Eiterfennen am Angesichte entstehen. *Prax. Cent. V. obs. 49.*

\*\*) Doerhaave, Geister, Bonnet und Smith in seiner Optik, erzählen Fälle von schwarzen Staaren, die durch den Speichelfluß geheilet worden sind. *S. auch Herrn Schmucker, vermischte chirurg. Schriften, 2 Th. S. 24.*

## Venerische Ohrenkrankheiten.

(Morbi venerei aurium.)

### Venerische Taubheit.

(Cophosis venerea.)

Es ist eine vom Lustseuchegifte entstandene, vollkommene oder unvollkommene Taubheit.

Gattungen sind:

1) T. vom unterdrückten Tripper. Man erkennt diese Gattung, weil sie bald nach der Hemmung des Trippers entsteht.

2) T. von einem Knochenauswuchse, oder von verhärtetem Ohrenschmalze, oder von einer Knochenzerfressung des Gehörwerkzeuges. Diese Fehler findet man bey der schon allgemeiner gewordenen Lustseuche.

3) T. von einem venerischen Fehler in der Kehle. Z. B. von der nach einer Verschwörung verwachsenen, oder verstopften, oder durch die angeschwollenen mandelförmigen Drüsen zusammengedrückten Eustachischen Trompete.

Die



Die Heilungsart erfordert bey allen Gattungen der Taubheit den innerlichen Gebrauch des Gummiquecksilbers. \*)

## Venerisches Ohrentriefen.

( Otorrhaea venerea. )

Es ist ein Ausfluß eines eiterförmigen Flüssigen aus dem äußerlichen Gehörgange.

Gattungen sind :

1) Einfaches O. welches sich nach unterdrücktem Tripper, ohne ein Geschwür, zuweilen einfindet.

Die Heilungsart erfordert den innerlichen Gebrauch des Quecksilbers, und eine Einsprizung der wässerigten Quecksilberauflösung.

2) Mit einer Knochenzerfressung verbundenen O. Zuweilen werden die Gehörknöchelchen und der knöcherne Gehörgang ( aurium fornix ) durch eine venerische Knochenzerfressung zernagt. Hieraus entsteht ein

\*) S. Herrn Prof. Trnka, *Historia Copioseos* p. 116. in diesem Werke findet man eine Sammlung von Beyspielen venerischer durchs Quecksilber geheilter Taubheiten. Ich habe ebenfalls neulich einen Studenten von einer nach unterdrückten Tripper erfolgten Taubheit durchs Gummiquecksilber geheilet.

ein ranziger Gestank der ausfließenden Feuchtigkeit, das Ausfallen der Gehörknöchelchen, eine unheilbare Taubheit, und, wenn die Knochenzerfressung den Felsenfortsatz bis ins Gehirn zerfressen hat, so kann auch der Tod selbst verursacht werden.

Die H. A. erfordert, außer dem innerlichen Gebrauch des Gummiquedcilsilbers, in die Gehörhöhle Einspritzungen aus der balsamischen Quedcilsilberauflösung zu machen.

## Venerische Nasenkrankheiten.

( Morbi venerei narium. )

### Venerisches Nasentriefen.

( Coryza venerea. )

Es ist ein Ausfluß einer eiterförmigen Feuchtigkeit aus der Nasenhöhle, ohne der Gegenwart eines Geschwürs.

Gattungen sind:

1) Tripperartiges N., oder Nasentripper. Bald nach unterdrücktem Tripper entsteht zuweilen ein Auströpfeln eines eiterförmigten und häufigen Rokes aus der Nase, ohne der Gegenwart eines Geschwürs.

Plente ven. Krankh.                      H                      in

in derselben. Diese ausfliessende Feuchtigkeit ist dem Tripperflüssigen vollkommen ähnlich.

Die Heilungsart erfordert den innerlichen Gebrauch des Gummiqued-silbers; äusserlich muß man die sehr geschwächte Qued-silberauflösung in die Nase ziehen.

2) N. von einer äusserlichen Ansteckung; wenn durch das Schnupstuch, oder die Finger das Trippergift in die Nase gebracht wird.

Die H. N. ist wie bey Uro. 1. \*)

### Venerisches Nasengeschwür.

( Ozaena venerea. )

Es ist ein venerisches Geschwür, in- oder ausser der Nasenhöhle.

Gat:

---

\*) Herr Tode erzählt: Medicinisch chirurg. Bibliothek, 7 B. 1. St. 22. S. aus Herrn Duncans *Medical cases*, folgende Geschichte: „Ein junger Mensch, der einen „Tripper hatte, sah sich genöthiget, eine kurze Zeit „sein Schnupstuch zu brauchen um das Hemd zu scho- „nen. Als er andere Lappen bekommen hatte, steckte „er aus Unachtsamkeit das Schnupstuch in die Tasche, „und bediente sich desselben, wie vorhin, die Nase zu „schneuzen. Die Wirkung war eine Krankheit inwen- „dig in der Nase, die in allen Stücken einem Tripper „ähnlich war. „— Herr Tode hat daher dieser Krank- „heit mit allem Rechte den Namen: Nasentripper, ge- „geben.

Gattungen sind:

1) Aeusserliches N. Es entsteht ein rother Fleck um die Nasenflügel, der sich nach und nach in ein flaches Beulchen erhebet, und verschwüret: dieses Geschwür zerfrisst die Nasenflügel und greift weit um sich, wenn nicht bald die gehörige Heilungsart vorgekehrt wird.

Die Heilungsart erfordert, den äusserlichen Ort mit der balsamischen Quecksilberauflösung zu bestreichen, und innerlich das Gummiuecksilber zu geben.

2) Innerliches N. Es ist ein Geschwür in der Nasenhöhle selbst, welches man am Ausflusse einer Eiterjauche, und durch die Besichtigung der Nase erkennt.

Die H. N. erfordert innerlich das Gummiuecksilber mit dem Aland.

Aeusserlich wird das Geschwüräzwasser ( aqua phagadenica, ) oder die balsamische Quecksilberauflösung in die Nase gezogen, oder gespritzt.

3) Mit der Knochenzerfressung vereinigt N. man erkennt es am Ausflusse eines dünnen und sehr stinkenden Eiters: zuweilen werden auch Theilchen der schwämmigten Knöchelchen oder der Nasenscheidewand ausgeschnäuzt. Die ganze Nase fällt ein.



Die Heilungsart ist wie bey der vorigen Gattung.

4) N. der Stirnschleimhöhle. Es entsteht ein mit der Knochenzerfressung vereinigtcs Geschwür über der Nasewurzel, welches bis in die Stirnschleimhöhle dringt, und durch den Griffel untersucht wird.

Die H. N. erfordert, der Tauche durch die Oeffnung der Schleimhöhle einen Ausgang zu verschaffen, wenn etwa die natürliche Mündung verwachsen wäre. \*) Ansonst müßte von aussen eine Durchbohrung gemacht werden.

### Venerische Ungestalttheit der Nase.

( Deformitas nasi venerea. )

Es ist ein Zusammenfallen, oder Mangel der Nase, an einer oder beyden Seiten.

Gattungen sind:

1) N. vom Zusammenfallen der Nase. Wenn die Knochenzerfressung die Nasescheidewand, durch welche die Nase unterstützt wird, oder, wie zuweilen geschieht, die eigenthümlichen Knöchelchen der Nase zerfressen hat, so fällt die ganze äussere Nase ein; das Angesicht wird bey solchen Personen wie bey einem Affen

ber=

---

\*) S. Herrn Richter, *Observ. chirurg. Fascis. II. p. 44.*

verunstaltet, und behält durchs ganze übrige Leben die Kennzeichen der vorher gegangenen Lustseuche.

Es ist ein unheilbares Uebel. Zuweilen wird sammt der Nase das ganze Angesicht erstaunlich verunstaltet. \*)

2) U. von einem mangelnden Seitentheile der Nase. Wenn an einer oder beyden Seiten die knorplichten Nasenflügel durch ein Geschwür verzehret worden sind, so steht die Nase an einer oder beyden Oeffnungen häßlich offen, fehlet gänzlich.

Dieses Uebel ist, wie das vorhergehende, unheilbar

H 3      Ve

\*) Severinus hat in seinem Buche *de abscessuum reconditu natura*. Neap. 1763 p. 178. die Schilderung einer sehr seltsamen Häßlichkeit des ganzen Angesichts von der veralteten Lustseuche geliefert. — Ich habe ein Bauerseweib gesehen, welcher von der eingewurzelten Lustseuche die ganze Nase so weggefressen war, daß an ihrer Stelle nur eine, kaum einer Erbse grosse Erhabenheit, mit einer gleich grossen Oeffnung übrig blieb; zugleich war, nach gleichsam verschwundenen und zusammengewachsenen Lippen der Mund so verengert, daß ich kaum die Spitze meines kleinen Fingers in die Höhle desselben bringen konnte. Die Zeichnung dieses ungestalteten Angesichts werde ich bey einer andern Gelegenheit mittheilen.

## Venerischer Mißlaut der Stimme.

( Paraphonia venerea. )

Es ist ein unangenehmer Laut der Sprache.

Gattungen sind:

1) M. von einem Fehler in der Nase. Wenn die Nasenhöhlen von einem venerischen Geschwüre, oder von einer venerischen Geschwulst verstopft werden, so wird die Stimme bloß durch den Mund, ohne Beyhilfe der Nase, gebildet.

2) M. von einem Fehler in der Kehle, z. B. von Geschwüren in derselben, von einer Zerfressung des Zäpfchens, oder einem Loche im Gaumen.

Die Heilungsart erfordert, die Ursachen dieses Mißlautes hinweg zu schaffen.

## Venerische Krankheiten des Mundes.

( Morbi venerei oris. )

### Venerische Schwämmchen.

( Aphthae venereae. )

**E**s sind oberflächliche kleine Geschwüre in der Höhle des Mundes.

Sie

Sie greifen nicht nur die Höhle der Kehle (sonst Rachenhöhle,) die mandelförmigen Halsdrüsen und das Zäpfchen, sondern auch die innere Oberfläche und die Ecken der Lippen an. Quecksilberschwämmchen brechen aber an den Seitentheilen und am Grunde der Zunge, wie auch am innern Theile der Wangen an den Mündungen der Stenonianischen Speicheldgänge häufig aus.

Gattungen sind:

1) G. von der allgemeinen Luftseuche. Diese Geschwürchen sind mit einem grauen, oder weissen Schleim überzogen, und wandern von einem Theile zu dem andern. Man erkennt sie an dem Vorhergange venerischer Zufälle.

Die Heilungsart erfordert innerlich das Gummi-quecksilber, äusserlich ein Quecksilbergurgelwasser.

2) G. von dem Stillen durch eine venerische Säugamme. Diese Gattung findet man sehr oft bey Kindern, die von einer solchen angesteckten Säugamme gestillet werden. Vom Küssen eines solchen Kindes können, wie ich gesehen habe, venerische Lippengeschwüre angeerbet werden.

Die Heilungsart erfordert bey Kindern den Quecksilbersyrop. Der Mund muß mit der, mit Honig  
5 4
oder



oder Syrop vermischen, wässerigten Quecksilberauflösung ausgewaschen werden.

## Venerische Gaumengeschwüre.

(Ulcera venerea palati.)

Es sind vom Lustseuchegifte entstandene Geschwüre im Gaumen.

Gattungen sind :

1) Einfache G. Sie fangen mit einem rothen, etwas erhabenen Flecke an, welcher nach und nach in ein unreines Geschwür ausartet, und nicht selten auch die Gaumenknochen mit einer Knochenzerfressung ansteckt.

Die Heilungsart erfordert die balsamische Quecksilberauflösung mit Rosenhonig ; innerlich das Gummi-quecksilber.

2) Den Gaumen durchbohrende Geschwüre. Zuweilen werden durch die Knochenzerfressung die Gaumenknochen bis in die Nasenhöhle durchgefressen ; dann wird, mit einem sehr widerlichen Anblicke ein Theil der Speisen und des Trankes während dem Hinabschlingen in die Nase und durch dieselbe wieder vorne hinaus getrieben.

Die Heilungsart erfordert, ausser dem innerlichen Gebrauche des Gummi-quecksilbers, mit der balsa-

mi-

mischen Quecksilberlösung das Geschwür den Tag hindurch einigemal, mittelst eines Pinsels, zu bestreichen; oder einen mit dieser Essenz befeuchteten Schwamm als einen Gaumensstopfer, in das ausgeessene Loch zu stecken.

### Venerische Kinnkräze.

( Scabies venerea menti. )

Es ist eine räudigte vom Lustseuchegifte erzeugte Kräze, die den Umfang des Bartes am Kinn einnimmt.

Die H. A. erfordert den innerlichen Gebrauch des Gummi-Quecksilbers; äußerlich die Quecksilberauflösung, oder das Geschwürakwasser. Aqua phagadenica.

### Venerische Hals- und Kehlekrankheiten.

( Morbi venerei colli et faucium. )

### Venerische Kröpfgeschwülste.

( Scrophulae venereae. )

Es sind Verhärtungen der Drüsen des untern Kinnbackens, oder der Halstrüsen.

Gattungen sind :

1) R. von der allgemeinen Lustseuche. Man erkennt sie an der Gegenwart anderer venerischen Krankheiten ; gemeiniglich sind sie gelinde entzündet. Zuweilen findet man eine , zuweilen auch mehrere. Selten werden sie zertheilet ; gemeiniglich gehen sie aber in langsame Halsgeschwüre über.

Die Heilungsart erfordert den innerlichen Gebrauch des Gummiuecksilbers ; äußerlich die balsamische Quecksilberauflösung , als eine Bähung.

2) R. von der verborgenen Lustseuche. Von, vormals venerischen Eltern , gebohrne Kinder , oder auch Kinder , bey denen der Kopfschind nicht vollkommen geheilet worden ist , bekommen , bey zunehmendem Alter , verglichen Kröpfgeschwülste. \*)

Zur innerlichen Heilung wird das Gummiuecksilber , das versüßte Quecksilber ( aquila alba ) und der Quecksilbermoor mit dem Mohnsaft gerühmt.

Des

---

\*) Herr Sausmann , *Diff. de morb. vener. larvatis*. Goetting. p. 55. glaubet , das kropfgeschwulstartige Säftverderbniß ( cacoehymia ) entsünde sehr oft von einer Ausartung des Lustseuchegiftes.

# Venerische Bräune.

( Angina venerea. )

Es ist ein, von dem in die Kehle abgesehten Luft-  
feuchegifte entstandenes, beschwerliches und schmerzgendes  
Hinunterschlingen,

Keinen venerischen Zufall findet man häufiger, als  
die Flecke und die Geschwüre der Kehle.

Gattungen sind :

1) Entzündungsartige B. man erkennt sie an  
rothen und breiten Flecken, die in oberflächliche kleine  
Geschwüre, oder venerische Schwämmchen, ausarten.

Die Heilungsart erfordert innerlich das Gum-  
mi-quecksilber und ein antiphlogistisches abführendes Mit-  
tel ; äußerlich ein Quecksilbergurgelwasser.

2) Schwürigte B. : man erkennt sie an grauen,  
unreinen, speckigten, breiten Geschwüren, die um den  
Speicheldrüsen- oder Luftröhrenkopf, das Zäpfchen, die  
mandelförmigen Drüsen und den Gaumenvorhang ( ve-  
lum palatinum ) um sich fressen ; an einer heischern,  
und durch die Nase kommenden Stimme, und an einem  
stinkenden, schleimigten Speichelflusse.

Die



Die Heilungsart erfordert innerlich das Gummi-quecksilber und den Sarzaparilleabsud; äußerlich ein Quecksilbergurgelwasser.

Wenn aber diese Geschwüre nicht bald heilen, so muß man sie den Tag hindurch öfters mit der balsamischen Quecksilberauflösung, mittelst eines Pinsels, bestupfen.

3) Eingekaltete B. Bey dieser Gattung werden die Geschwüre entweder schon krebssigt, oder die Knochenzerfressung greift schon die Körper der Halswirbelknochen an. Ich habe auch in diesem Falle von dem Einpinseln der Kehle mit der balsamischen Quecksilbersolution, zuweilen gute Wirkungen gesehen. \*)

4) B. Von einer venerischen Schlingenhemmung. (*dysphagia*) Man erkennt diese Gattung aus der Empfindung eines Knotens oder Hindernisses welches man in der Schlundhöhle selbst zu seyn glaubte,

---

\*) Ich habe mehrere mit jahrelangen Kehlegeschwüre behaftete, die sich nicht nur des Gummi-quecksilbers, sondern auch des ägenden Sublimats, und des verflühten Quecksilbers, mit, und ohne erfolgenden Speichelfluß, ohne alle Besserung der Geschwüre lange bedient hatten, nachdem ich dieselben vom Gebrauche aller übrigen Quecksilberarzneyen hatte aufhören lassen, die Kehle mit der mit ägenden Sublimat verfesten Mastixessenz eingepinselt, und auf diese Art in einigen Wochen vollkommen geheilet.

te, und an den vorhergegangenen, oder noch gegenwärtigen Zeichen der Lustseuche. \*)

Die Heilungsart erfordert das Gummiquedksilber; die Schlingenhemmung hingegen, die von einer vermehrten Empfindlichkeit der Kehle, nach gehörig geheilten Geschwüren zurück bleibt, wird durch die Zeit von sich selbst gehoben.

## Venerische Knochenkrankheiten.

( Morbi venerei ossium. )

### Venerische Knochenbeule.

( Tophus venereus. )

**E**s ist eine ( topica ) von dem in die Knochensubstanz abgesetzten Lustseuchgift entstandene, örtliche Anschwellung der Knochen.

Ist

\*) Eine Bemerkung von einer solchen Schlingenhemmung, die ohne das Daseyn anderer venerischen Kennzeichen, doch von der verborgenen Lustseuche entstanden, und endlich durchs Quedksilber geheilet worden war, erzählt Herr de Meza. — S. auch Herrn Strat Beobacht. von der Petterschen Krankheit, S. 233. Eine nach geheilten venerischen Kehlegeschwüren zurückbleibende Schlingenhemmung hat auch Herr Duncan gesehen. S. *Medical cases*. p. 170.

Ist eine Knochenbeule härter ( oder wohl auch , eben so hart ) als der Knochen selbst , so nennt man sie Knochenauswuchs , ( *exostosis* ) ist sie aber sehr weich , venerische gummiartige Knochengeschwulst. ( *Gummi venereum* : gummiartige Knochengeschwulst sage ich , um zwischen der wahren Knochenenerweichung , von welcher weiter unten eine Meldung geschieht , doch einen Unterschied zu machen. )

Die nächste Ursache ist eine Erhebung ( Auseinanderweichung ) der Knochenblättchen oder des Knochenhäutchens von dem zwischen denselben ergossenen venerischen Schleim.

Der gewöhnlichste Sitz ist : die Hirnschaale , der Schlüsselknochen , der Brustknochen , der ( grössere ) Vorderknochen , der Schienknochen.

Gattungen sind :

1) Einfache K. man erkennet sie an einem tief-sitzenden , unbeweglichen , flachen , dem Knochen an Härte fast ähnlichen , gemeiniglich eysförmigen , an Farbe von der übrigen Haut nicht verschiedenen , und größtentheils mit einem starken Knochenschmerze verbundenen Geschwulst.

Die

Die Zertheilung erfordert den innerlichen Gebrauch des Gummiquacksilbers, und einen Absud von der Sarsaparille, mit der Seidenbastwurzel. \*)

2) Mit der Knochenzerfressung verbundene R. Man erkennet sie an einer vorhergängigen Entzündung und nachfolgenden Abweichung und Verschwörung der weichen Theile.

Die Heilungsart erfordert den angegriffenen Ort zu entblößen, und dann die Sublimatauflösung mit der Mastixessenz zu gebrauchen.

## Venerische Knochengeschwulst.

( Hypeostolis venerea. )

Es ist eine von dem in die schwämmigte Substanz der Knochen abgesetzten Lustseuchegifte entstandene

---

\*) Herr Ruffel rühmt die Rinde dieser Wurzel ( *daphnis mezeraeum* ) bey venerischen Knochenbeulen und Knochen Schmerzen sehr an: durch 16 praktische Fälle erweist er; daß Knochenbeulen, die an Grösse öfters einer Haselnuß gleich kamen, blos durch diese Rinde in einem Monate zertheilt worden sind. Aber bey wahren Knochenauswüchsen nützte sie wenig. Herr Ruffel berichtet zweien Fälle, wo eine Knochenzerfressung zugegen war, die doch, während dem Gebrauche der Rinde, nach einem aufgelegten Aegmittel und erfolgter Abblätterung glücklich geheilet worden. S. *Medical observat. and inquir.* T. III. p. 189. — Herr Razoux lobet auch den Absud der Bittersüßstengel, zur Heilung der Knochenbeulen. S. *Journ. de Médec.* T. XXII. p. 236.



ne Anschwellung des ganzen Endes eines langen Knochens.

Gattungen sind:

1) Einfache K. man erkennt sie an der Anschwellung des ganzen Endes irgend eines Knochens. Wenn das Uebel noch frisch, und die Geschwulst noch nicht zu einer knochenauwüchsigten Härte gekommen ist, so wird sie wie eine Knochenbeule zertheilet, außer dem ist sie unzertheilbar.

Man rühmt den innerlichen Gebrauch des weissen Quecksilberpräzipitats, oder des (fälschlich sogenannten) durch sich selbst niedergeschlagenen Quecksilbers; von welchen man täglich ein Gran giebt.

2) Mit der Knochenzerfressung verbundene K.; man erkennt sie an den Zeichen einer schwürigten Knochenbeule.

Die Heilungsart erfordert, außer dem innerlichen Gebrauche des GummiQuecksilbers, tiefe Einbohrungen in den angegriffenen Knochen, um dem verdorbenen Knochenfaste einen Ausgang zu verschaffen. Hat die Knochenzerfressung schon das ganze Ende des Knochens angegriffen, so bleibt nur noch die Absehung übrig.

## Venerische Knochenzerfressung.

(Caries venerea.)

Es ist ein vom Lustseuchegifte entstandenes Verderbniß an der äussern Oberfläche eines Knochens.

Der gewöhnlichste Sitz ist in der Nasenhöhle, an der Hirnschaale, \*) an den Schlüsselbeinen, am Brustblat.

- 
- \*) Herr Morgagni sah ein altes Weib, bey welchen, durch die venerische Knochenzerfressung, von dem linken Vorderhauptknochen, und dem daran stossenden Stirnknochen so viel weggenommen worden war, daß man durch ein dreyquersfinger grosses Loch das ganze Gehirn sehen, und zugleich wahrnehmen konnte, wie, bey dem Befühlen der Schlagader an der Handwurzel in dem nämlichen Zeitpunkte, das Gehirn mit derselben zugleich erhaben wurde, und zugleich niedersank. Die Gehirnhaut selbst war aber rein und unverletzt; s. *de sedib. et caus. morb. trib. IV. Epist. 56. art. 11. et 12.* — Libavius fand bey einem venerischen Weibe den ganzen Schläffknochen sammt den halben Vorderhauptknochen von einer Knochenzerfressung zerstört, und auch das Gehirn bis an seine Höhlen (ventriculi) aufgezehrt; aus dieser Ursache folgte auch nach einer Schlassucht der Tod. S. *Ephem. Nat. curios. cent. VIII. Obs. 21. p. 284.* — Bey einer Hure wurde durch Quecksilberarzneyen ein einige Zoll grosses Stück des Stirnknochens von der Mittelnknochensubstanz (diploë) abgesondert, so, daß eine sehr häßliche Narbe zurück blieb. S. *Trioen Observat. Fascic. p. 45.* — Ein Beyspiel einer ähnlichen Absonderung hat auch Stalpart van der Wiel, *Centur. prior. Observ. 4.*

blatte , am größern Vorderarmknochen (os cubiti , vormals Ellenbogen , bey Linigen: Ellenbogenbein: beydes , nach meinem Urtheile , auszumärzen ; weil die hier neu eingeführten Benennungen bezeichnender sind ) am Schienknochen.

Gattungen sind :

1) Vertikale K. die nur eine Stelle eines Knochens einnimmt. Gemeinlich entsteht sie von einer vorhergängigen Entzündung des Knochenhäutchens , einer Knochenbeule oder einer gummiartigen Knochengeschwulst , die in Vereiterung übergangen sind ; seltner von einem bis an den Knochen durchnagenden Hautgeschwür.

Die Heilungsart erfordert äußerlich die balsamische Quecksilbersolution mit Rosenhonig , innerlich das Gummiuecksilber mit Asand , dem Sarzaparille und Seidenbastabsud.

2) Allgemeine K. diese greift fast die ganze Oberfläche eines oder mehrerer Knochen an. \*) Man

---

\*) Herr Knolle beschreibt, *Diff. de ossium carie venerea* p. 18. vier Hirnschaalen , bey denen die Knochen des Kopfes und des Gesichts an mehreren Orten von der Knochenzerfressung angegriffen waren. Hofmann sah alle Beckenknochen eines Knaben so löcherigt , als immer ein von der Fäulniß zerfressenes Holz seyn kann : die Ursache war eine angeerbte Lustseuche. S. Olitzsch *Diff.*

erkennt sie , weil an mehreren Orten die weichen über den angegriffenen Theil liegenden Knochen verschwüret werden.

Die Heilungsart kann man , wie bey der vorigen Gattung versuchen ; seltner gelingt sie aber bey der allgemeinen Knochenzerfressung ; denn diese tödtet gemeiniglich durch eine Auszehrung.

### Venerischer Winddorn.

(*Spina ventosa venerea.*)

Es ist ein vom innersten der Knochen anfangendes und nach aussen gehendes Knochenverderbniß.

Diese Krankheit findet man sehr oft bey den von venerischen Eltern erzeugten Kindern. Bey Erwachsenen kömmt der Winddorn fast immer von einer venerischen Quelle.

J 2

Die=

---

*de spina ventosa. Lips. 1672. S. 4. — Herr Cheselden beschreibt in dem Werke: Osteographia. or the Anatomy of the bones. Lond. 1733. Tab. XLII. fig. I. das Skelet einer venerischen Weibsperson, bey welchem bey nahe kein einziger Knochen gesund war. — Auch hatte ein Skelet, S. Heyne Tentam. de praecip. Off. morb. S. 29. welches vom Lustseuchegift so zernaget und mit unzähligen Löcherchen durchbohret war: daß es kaum nur noch den geringsten Zusammenhang hatte: Auch zierte es aus dieser Ursache mit dieser kurzen Aufschrift: Amor intimis inhaeret medullis; die Liebe wohnt im Innersten der Knochen.*



Diese Krankheit pflegt die kleinern Knochen der Hand und des Fußes, und die Ende der langen Knochen anzugreifen.

Gattungen sind:

1) Anfangender W.: man erkennt ihn an einem tief sitzenden Knochenschmerze, welcher langwüthig ist, und endlich an der überliegenden Haut eine Röthe und Anschwellung verursacht.

Die Heilungsart erfordert innerlich das Gummi-Quecksilber; äußerlich die Quecksilbersalbe.

2) Offener W.: es entsteht am angegriffenen Theile endlich eine rothe, schwämmigte, mit mehreren schwürenden Löcherchen durchbohrte Geschwulst.

Die Heilungsart erfordert innerlich das Gummi-Quecksilber, oder das versüßte Quecksilber (aquila alba,) mit Asand und dem Absude der Fiebertinde, der Seidenbastinde, des Schierlings und der Carzaparille; äußerlich muß man das Geschwür mit der mit ätzendem Sublimat und Rosenhonig vermischten Mastixessenz benetzen, und dann die Geschwulst mit der Quecksilbersalbe verbinden. Auf diese Art habe ich mehrere geheilet.

## Venerische Knochenweichung.

(Molities venerea ossium.)

Es ist eine vom Lustseuchegifte entspringende Biegsamkeit der Knochen.

Gattungen sind :

1) Deutliche K. ; zuweilen wird ein Knochen nur hier oder dort , gleich dem Wachse erweicht : Beispiele hat man an den Knochenbeulen.

Die Heilungsart ist wie bey den Knochenbeulen.

2) Allgemeine K. ; sie greift mehrere , oder alle Knochen zugleich an. Zeichen dieser Gattung sind : die Grösse des Körpers ( statura ) wird , nach vorher gegangenem Knochenschmerze , vermindert ; der Kranke kann nicht stehen ; der Harn ist kalterdesührend ( calcarea ) trübe ; die Knochen werden krumm , man kann sie dann leicht ausdehnen , und sie werden auch leicht abgebrochen.

Diese Krankheit ist unheilbar : weder die Quecksilberfalbe , noch schaarbockheilende ( antiscorbutici ) Pflanzensäfte , noch der Malzaufguß , noch die Färber- röthe , haben einigen Nutzen geschafft.

## Venerische Knochenzerbrechlichkeit.

(Fragilitas venerea ossium.)

Es ist eine Beschaffenheit der Knochen, bey welcher sie durch die geringste Ursache zerbrochen werden.

Sie ist ebenfalls entweder örtlich oder allgemein.

Gattungen sind :

1) K. von der Knochenerweichung : man erkennt sie an der von sich selbst entstandenen (spontanea) oder leichten Krümmung der Knochen. Der Bruch eines weich gewordenen Knochens ist unheilbar. \*)

2) K. von einer venerischen Knochen austrocknung: (ariditas) die Knochen sind bey dieser Gattung, ohne daß sie beugsam wären, leicht zerbrechlich. Die Heilung eines solchen Bruches ist auch nicht möglich. \*\*)

3) K. von einer venerischen Knochenzerfressung; denn diese verzehrt die innere Knochen substanz, und

---

\*) In den medicin. Bemerk. einer Gesellsch. von Aerzten in London. 6. B. 216. S. findet man eine Geschichte von durchs Luffsenchegift erweichten und zugleich zerbrochenen Knochen.

\*\*) Freyh. van Swieten, Comment. T. I. p. 567.

und daher wird ein solcher Knochen am angegriffenen Orte leicht zerbrochen. \*)

Ein solcher Bruch ist unheilbar, wenn der angegriffene Ort nicht vorher abgeblättert wird.

## Venerische Gelenkfrankheiten.

(Morbi venerei articulationum.)

(Bey Einigen, aber unrichtiger, Gelenkgeschwülste oder Gliedergeschwülste: welches auch im vorne stehenden Verzeichnisse zu ändern.)

## Venerische Gelenkbeulen.

(Ganglia venerea.)

**E**s sind den Sackgeschwülsten (tumores cystici) ähnliche Geschwülste, die bey denen mit der Lustseuche Behafteten hier und dort um die Gelenke entstehen.

Nicht venerische Sackgeschwülste sind kaltartig, und zu Entzündungen und Vereiterungen gar nicht geneigt. Venerische Sackgeschwülste hingegen werden von gäher,

I 4 flüch-

\*) Herr Reibel hat in den *Adversar. medic. pract. vol. III. part. IV. p. 580.* eine Bemerkung von einem durch die venerische Knochenzerfressung angegriffenen und dann von sich selbst zerbrochenen Schenkelknochen mitgetheilt.



flüchtig vorüber gehender Hitze, Röthe, und nachlassendem Schmerze begleitet. Oefters entstehen auch mehrere dergleichen Geschwülste auf einmal.

Gelenkbeulen unterscheiden sich von gummiartigen Knochengeschwülsten durch ihre Beweglichkeit. Zuweilen entstehen sie von der allgemeinen, zuweilen von der verborgenen Lustseuche, wie die Augenliederknötchen (hordeola.)

Die Heilungsart erfordert innerlich das Gummi-quecksilber, und einen Absud der Lustseuchehölzer ( decoctum lignorum ) oder der Sarzaparille mit der Seidenbastrinde; äußerlich die Sublimatauflösung und die Quecksilberfalbe. \*)

Ves

---

\*) Ein fünf und dreyßigjähriger Mann hatte schon über ein Jahr lang eine unschmerzhaftige Geschwulst der linken Hode, von einem unterdrückten Tripper, und bekam öfters Augenliederknötchen, und auch drey gelenkbeulenähnliche Geschwülste an der äußern Seite des linken Knies, sammt einer ähnlichen, aber sehr schmerzenden und entzündeten Geschwulst an der innern Seite des rechten Knies; nach gegebenem Gummi-quecksilber kam der schon über ein Jahr weggebliebene Tripper wieder zurück, die Hodengeschwulst verschwand, und auch die Gelenkbeulen wurden mit dieser Methode in sechs Wochen vollkommen geheilet.

# Venerische Gelenksteifheit; Gliedersteifheit. (Anchylosis venerea.)

Es ist eine vom Lustseuchegift entstandene Unbeweglichkeit eines Gelenkes.

Gattungen sind:

1) G. von einer Knochengeschwulst: man erkennt sie durchs Befühlen, welches die Anschwellung des Knochen Endes lehret. S. Knochengeschwulst.

2) G. vom verdickten Gelenksaft, (synovia) hier ist die Geschwulst kugligter, und es ist keine entzündungsartige, schmerzende Geschwulst vorher gegangen.

Die Heilungsart erfordert innerlich das Gummi-quecksilber und den Lustseuchehölzer- oder den Seidenbast- rinde Absud; äußerlich die Quecksilberauflösung als eine Bähung, oder die Quecksilbersalbe mit dem Ammoniakgummi.

3) G. von einer Gelenkänderentzündung. Die Geschwulst ist im Anfange sehr schmerzend, bey der Nacht wird sie etwas roth.

Die H. A. erfordert, bey'm Entzündungszeitraume, das Gummi-quecksilber mit einer Saamenmilch mit Salpeter, wie auch ein antiphlogistisches abführendes

Mittel; äußerlich den Alraunhonig mit der Quecksilber-  
salbe. Zuweilen hat auch die wässerigte Quecksilberauf-  
lösung Nutzen geschafft.

---

## Venerische Frauenzimmerkrankheiten.

(Morbi venerei sexus feminei.)

### Krankheiten der Geburtstheile.

(Morbi partium genitalium.)

### Venerischer weißer Fluß.

(Leucorrhæa venerea,

seu

Fluor albus venerens.)

Es ist ein vom Lustseuchegifte entstandenes Ausfließen  
(stillicidium) eines eiterförmigten Schleims aus  
der Scheide bey Frauenzimmern,

Gemeiniglich bekommen sie ihn vom Beyschlaf mit  
einer Mannsperson, die den venerischen Tripper hatte;  
seltner durchs Stillen eines venerischen Kindes, oder  
durch die Unerbung.

Die Zeichen, an welchen man den venerischen  
Frauenzimmertripper vom nicht venerischen unterscheiden  
kann, sind:

1) Eine gähe Anwandlung dieses Uibels einen oder zween Tage nach einem unreinen Beyschlase ; der gutartige fängt langsam an ;

2) Brennen in der Scheide oder Sarnbrennen, welches sich bey dem frischen Tripper nicht selten einfindet ; der gutartige ist unschmerzhaft , wenn er nicht veraltet ist :

3) juckende Eiterbläschen, oder schwämmchenartige Geschwürchen in der Schamböhle, die sich auch bey dem noch nicht lange währenden Tripper zeigen ; denn die Schwämmchen gesellen sich nur zum schon veralteten, gutartigen Tripper :

4) ein eiterförmigtes , gelbgrünlichtes , Flüssiges , welches aus der Scheide trieft , und bey dem gutartigen Tripper entweder schleimigt , oder nur milchförmigt ist :

5) die Ansteckung einer gesunden Mannsperson mit einem venerischen Tripper ; welches das sicherste Kennzeichen ist.

Gattungen der Verschiedenheiten ( varietates ) sind , der einfache, mit andern Krankheiten vereinigte und veraltete Frauzimmertripper.



1) Einfacher F. Dieser hat in den Schleimdrüsen um den untern Rand der Scheide seinen Sitz: man erkennt ihn am Ausflusse eines eiterförmigten Schleims aus der Scheidehöhle.

Diese Gattung ist gewöhnlich bey ihrem Anfange vom Harnbrennen frey, aber mit einem geringen Brennen in der Scheide und Jucken in der Schamböhle begleitet; hält lange an, und endlich wird die ausfließende Feuchtigkeit ganz schleimigt, und hört langsam nach und nach auf.

Wegen der Feuchtigkeit der Scheide ist der Frauenzimmerrripper schwerer zu heilen und langwähriger, als der männliche.

Die Heilungsart erfordert:

1. ein gelind abführendes Pulver.
2. den Klettenwurzelabsud durch die ersten Wochen, dann giebt man
3. ein gelind abführendes Pulver mit einigen Tropfen Kopaiwabalsam, und macht
4. eine Einspritzung aus der Quecksilberauflösung; die täglich viermal wiederholt werden muß.

2) Mit andern Krankheiten vereinigte F.,  
z. B. mit einer Entzündung der Harnröhre, oder der  
Öeffnung derselben, oder der Santorianschen Drüse.  
Man erkennt das Daseyn dieser Gattung an der Rö-  
the des entzündeten Ortes, dem Ausflusse eines eiter-  
förmigen Flüssigen aus der Harnröhreöffnung, oder ei-  
nem entzündungsartigen Beulchen der gesagten Drüse,  
die an der Seite des Scheideschließmuskels ihren Sitz  
hat, und an einem starken Brennen während dem Har-  
nen oder nach demselben. Zugleich ist eine Empfindung  
eines aus der Schamböhle fallenden Körpers zugegen.

Die Heilungsart soll anfänglich antiphlogistisch  
und mit dem Gummiquecksilber verbunden seyn, wie  
beim Entzündungszeitraume des männlichen Trippers.  
Wenn dieser Zeitraum nun vorüber ist, so ist die Hei-  
lungsart des eiternden Zeitraumes des Trippers anzu-  
wenden, die Quecksilbereinspritzungen sind ebenfalls fort-  
zusetzen.

Der mit Geschwürchen, juckenden Eiterbläschen,  
Feigwarzen oder andern Krankheiten vereinigte Frauen-  
zimmertripper muß so behandelt werden, wie es diese  
Krankheiten insbesondere erfordern.

3) Veralteter F., welcher schon durch mehrere  
Monate, oder über ein Jahr währet. Die Ursache dieser  
Gattung ist entweder ein Verlust der Spannkraft der  
Schleim-

Schleimhöhlen der Scheide, oder ein Geschwür in der Gebärmutter oder im Umfange der Scheide.

α) Veralteter schleimigter Frauenzimmertripper; man erkennt ihn am Ausfließen eines dünnen, nicht eiterigten, Schleimes, und der Abwesenheit eines örtlichen Schmerzes in der Gebärmutter, oder in der Scheide.

Die Heilungsart erfordert innerlich stärkende Mittel; z. B. einen stärkenden Wein aus der Fieber- oder der Winterschen Rinde, den Blättern der Bärentraube, und dem Eisen.

Außerlich dienet eine Einspritzung der schwachen Vitriolauflösung (aqua vitriolata) des kalten Wassers, und ein Bad vom kalten Wasser.

β) Veralteter schwürigter F.: man erkennt ihn am Ausflusse eines Eiterflüssigen, oder einer Jauche, am örtlichen Schmerze, und durch die Untersuchung mit dem Finger. Der von einer durch zusammenziehende Arzneyen gehemmten Gebärmutterverschwürung entstandene Frauenzimmertripper artet in die Luftgeschwulst der Gebärmutter aus. S. Luftgeschwulst der Gebärmutter.

Die H. U. dieser Gattung erfordert, das in der Gebärmutter- oder Scheidehöhle verborgene Geschwür

zu heilen : S. also Geschwüre der Gebärmutter-  
scheide , und Geschwüre der Gebärmutter.

## Venerische Entzündung der Schamtheile. ( Phlogosis venerea genitalium. )

Es ist eine vom Lustseuchemiasma entstandene Entzündung in der weiblichen Scham ( sinus muliebris ) oder in der Gebärmutter-  
scheide.

Sie ist bald mit , bald ohne , den Frauenzimmer-  
tripper.

Gattungen sind :

1) E. in der weiblichen Scham : es ist eine  
( entzündete , denn es giebt auch wasser- und luft-  
schwülstige Anschwellungen dieser Theile ) Anschwel-  
lung der Schamlezen und der Scheidemündung. Man  
erkennt sie durch den Augenschein , das Brennen in  
der Scham , und das Harnbrennen während dem Harnen.

Die Heilungsart erfordert eine gelind labführende  
Arzney ; Aderlässe , wenn die Entzündung sehr groß ist ;  
eine kühlende Saamenmilch mit dem Gummi-  
quecksilber. Aeußerlich ist die Quecksilbermilch oder die Quecksilber-  
auflösung als eine Bähung zu gebrauchen.



Zuweilen geht eine, oder auch beyde, Schamliesen in die Vereiterung über, und es fließt aus mehreren Oeffnungen Eiter; in diesem Falle muß man die mit dem Schleimpflaster vermischte Quecksilbersalbe auflegen.

2) Entzündung der Santorinschen Drüse. Man erkennt sie an einem entzündeten Knötchen an der Seite der Scheidemündung, sammt einem heftigen Jucken, und Brennen in der Scham.

Die Heilungsart ist wie bey No. 1.

3) Entzündung der Gebärmutterseide. Sie besteht in einem Brennen in der Scheide selbst, welches durch mehrere Monate anhält, und selten ohne Geschwür, sehr oft aber ohne Frauenzimmertripper ist.

Die H. N. ist wie bey den Gebärmutterseidegeschwüren.

**Venerische Verhärtung der Geburtstheile.**  
(Induratio venerea genitalium.)

Es ist eine venerische Verhärtung der Scham oder der Scheide.

Gemeiniglich entsteht sie von einer vorher gegangenen Entzündung, und gebrauchten stark zusammenziehenden Einspritzungen.

Gat-

Gattungen sind :

1) B. der weiblichen Schamhöhle (sinus muliebris.) Es ist eine vollkommene Verhärtung der ganzen Schamlezen : zuweilen ist auch zugleich die Scheidemündung von einer solchen Verhärtungsgeschwulst sehr verengert.

2) Knötigte B. Durchs Gefühl entdeckt man eines, oder mehrere Knötchen in der Schamhöhle, oder an den Schamlezen. Zuweilen ist auch die Scheide mit ähnlichen, aber kleineren Knötchen angefüllt.

Wenn dieselben veraltet sind, so arten sie zuweilen in sehr bössartige Krebsgeschwüre aus.

Die Heilungsart erfordert innerlich das Gummi-quecksilber mit dem Mohnsaft; äußerlich eine Bähung aus den Schierlingsblättern und der Quecksilbersolution, bey der Nacht ein Quecksilberliniment.

**Venerische Geschwüre der weiblichen Scham.**  
( *Ulcera venerea vulvae.* )

Es sind venerische Geschwüre an der weiblichen Scham, die von den Franzosen *chaneres* genannt werden.

1) Schwämmchen = G. Sie entstehen von zunehmenden Bläschen, oder von Krystallbläschen, die am Ende in oberflächliche, aschfärbige, oder weißlichte Geschwürchen übergehen.

Sie werden durchs Waschen der Scham mit der balsamischen Quecksilberauflösung leicht geheilet.

2) Um sich fressende G. Sie entstehen von einem breiten, rothen Flecke, oder von einem Entzündungsbeulchen an den kleinern Schamleszen, oder an der Santorinschen Drüse; sie sind sehr schmerzend, und fressen immer weiter um sich; so, daß sie nach und nach die kleinern Schamleszen, das Schamzüngelchen, und die Deffnung der Gebärmutterseide ausfressen, wenn man nicht bald die gehörige Heilungsart vorsehret.

Die Heilungsart, erfordert innerlich den Gebrauch des Quecksilbers, und äußerlich die balsamische Quecksilbersolution.

3) Krebsartige G. Sie entstehen von scirrösen Beulchen an der Scham, sind sehr schmerzend, fressen schnell um sich, und werden schwer geheilet; zuweilen gehen sie in einen wahren venerischen Krebs der Scham über.

Die Heilungsart erfordert Gummiquecksilber mit Mohnsaft. Außerlich hat man sich der balsamischen Quecksilberauflösung zu bedienen.

De-

# Venerische Geschwüre an der Gebärmutter- terscheide.

(*Ulcera venerea vaginae.*)

Es sind venerische Geschwüre in der Höhle der Gebärmutterterscheide.

1) Einfache G. Es sind oberflächliche, nicht weit um sich fressende, auch nicht sehr schmerzende Geschwürchen. Man erkennt sie am Ausflusse des Eiters, und an einem örtlichen Schmerze bey der Untersuchung mit dem Finger.

Die Heilungsart erfordert den innerlichen Gebrauch des Gummiuecksilbers, und die Einsprizung einer balsamischen Quecksilberauflösung.

2) Um sich fressende G. Diese Gattung verursacht heftige Schmerzen, weil die Entzündung zugleich den ganzen Umfang des Geschwüres einnimmt, und die Oberfläche der Scheide hier und dort in Schrunden berstet, aus denen immer eine äusserst scharfe Eiterjauche triefet.

Die Heilungsart erfordert, ausser dem innerlichen Gebrauche des Quecksilbers, zugleich den Mohnsaft; äusserlich sprizt man eine balsamische Quecksilberlösung ein.



3) Verborgene G. Zuweilen haben Geschwüre am obern Theile der Scheide ihren Sitz, sind sehr wenig schmerzend, und es trieft auch nur ein sehr kleinen Theil eines dünnen Eiters aus. Dergleichen Geschwüre verursachen keinen beträchtlichen Zufall, an dem man ihr Daseyn erkennen könnte. Denn es findet sich kein Frauenzimmertripper, kein Schmerz, oder keine Beschwerlichkeit beym Harnen ein: und diejenigen Schmerzen, die die Frauenzimmer während dem Beyschlase, oder beym Befühlen mit dem Finger an dem angegriffenen Orte empfinden, pflegen sie von ganz andern und unschuldigen Ursachen herzuleiten.

Folglich kann ein solches Frauenzimmer angesteckt seyn, ohngeachtet es bey der genauesten Untersuchung und Besichtigung der Geburtsheile gesund zu seyn scheint, und ohngeachtet es sich selbst für gesund hält. Hier sieht man nun, wie es zugeht, wenn Mannspersonen zuweilen mit einem Tripper, oder mit Chancres, von einer, dem Ansehen nach sehr gesunden Frauensperson, angesteckt werden.

Die Heilungsart ist wie bey der vorhergehenden Gattung.

G. an den Harnwegen. Es sind Geschwüre, die aus der Scheide in die Harnröhre, oder in die Blase, dringen. Wenn sie bloß in die Harnröhre gehen, so dringet der Harn nur beym Harnen in die Schei-

Scheide; hat aber das Geschwür den Hals oder die Höhle der Harnblase selbst zerfressen, so tröpfelt er beständig in die Scheide.

Die H. N. ist im ersten Falle leichter; im letztern äusserst schwerer. Man muß ein hohles, mit dem Quecksilverbalsam bestrichenen Kerzchen in die Harnröhre, oder in die Blasenöhle stecken; und in die Scheide eine Quecksilbereinsprizung machen.

3) Roth = G. oder Mastdarm = Scheidegeschwüre. Es sind Geschwüre, die aus der Gebärmutter Scheide so weit in den Mastdarm bringen, daß wenigstens der flüssigere Theil des Unrathes, durch die Scheide ausfließt.

Die Heilungsart ist sehr schwer. Man kann eine Quecksilbereinsprizung in die Scheide versuchen, und ein etwas breiteres, aus einem Kerzchen gemachtes Röhrchen hinein stecken, um den Austritt des Unrathes aus dem Mastdarne zu verhindern; auf diese Art wird die Heilung des Geschwüres erleichtert.

## Venerische Gebärmutterkrankheiten.

( Morbi venerei uteri. )

### Venerische Hemmung der monatlichen Reinigung.

( Meroostasia venerea. )

**E**s ist eine vom Lustseuchegifte entspringende Hemmung der monatlichen Reinigung.

1) H. vom Frauenzimmertripper. Ich habe sehr viele mit dem venerischen Frauenzimmertripper behaftete Frauenzimmer gesehen, bey denen schon über ein Jahr das Monatliche nicht floss. Bey allen diesen wurde es durch das einen Monat lang gegebene Gummiquestilber wieder glücklich in Ordnung gebracht.

2) H. von der allgemeinen Lustseuche. Zuweilen bleibt das Monatliche, ohne die Gegenwart des Frauenzimmertrippers, aus; wenn das Blut durchs Lustseuchegift zähe gemacht, oder die Gebärmutter verstopfet worden.

Die Heilungsart erfordert das Gummiquestilber.

## Venerische Gebärmutterverschwörung.

( Exulceratio venerea uteri. )

Es ist eine Verschwörung an der innern Oberfläche, oder am Munde der Gebärmutter.

Gemeiniglich folgt sie auf den gehemmten veralteten Frauenzimmertripper.

1) B. der Gebärmutterhöhle. Daß fast die ganze Oberfläche der Gebärmutter durch die Lustseucheschärfe angegriffen sey, erkennt man an einem Brennen in der Gebärmuttergegend, am dünneiterigten Frauenzimmertripper, am Harnbrennen, und Harnzwange, an der Auszehrung des ganzen Körpers und einem heftischen Fieber.

Die Heilungsart wird gemeiniglich ohne Erfolg versucht, oder gelingt nur sehr schwer. Sie erfordert aber den innerlichen Gebrauch des GummiQuecksilbers mit Mohnsaft und mit dem gesättigten Sarzaparilledekokt und mit der Milch.

Außerlich muß man, nicht bloß in die Scheide, sondern in die Gebärmutterhöhle selbst, mit einem dazu tüchtigen Instrument Einspritzungen, von der balsamischen Quecksilbersolution machen.



2) B. des Gebärmuttermundes. Die Zufälle sind die nämlichen, wie bey der vorigen Gattung, nur etwas gelinder; mit dem Finger kann man die zer-rissene schwürigte Mündung fühlen.

Die H. A. kann man auf die nämliche Art versuchen.

### Venerische Luftgeschwulst \*) der Gebärmutter.

(*Physometra venerea*, seu *Tympanites uteri venerea*.)

Es ist eine Anschwellung der Gebärmutter, von der dieselbe ausspannenden Luft und Eiterjauche.

Sie folgt gemeiniglich auf eine langwährige Gebärmutterverschwürung.

1) U. von einer Verwachsung des Gebärmuttermundes. Nach vorher gegangenen Zeichen der Verschwürung entsteht an der untern Schmeerbauchgegend eine beständige, runde, elastische, (dem Gefühle der Kranken) leichte (*levis*) Geschwulst; man bemerkt auch keinen Austritt eines Schalles aus der Scheide,  
oder

---

\*) Diese Benennung halte ich für schicklicher, bezeichnender, der guten Griechischen ähnlicher, als die von Andern angenommene Windsucht.

oder keinen gähen Ausfluß einer Eiterjauche aus derselben.

Die Heilungsart läßt sich, wegen der Verwachsung des Gebärmuttermundes, nicht erwarten.

2) U. von einer Verstopfung des Gebärmuttermundes. Nach vorher gegangenen Zeichen der Gebärmutterverschwürung, schwillt dieselbe, wie bey der vorher gehenden Gattung, gähe an; zuweilen aber fließt zugleich eine eiterhafte scharfe Jauche mit einem Schalle aus der Scheide (*crepitu vaginali*,) oder einem lauten Austritte einer stinkenden Luft aus derselben, heraus; worauf die Geschwulst etwas kleiner wird. \*)

R 5

Die

\*) Der Freyherr von Störk hat die Gebärmutterluftgeschwulst an zweyen Weibspersonen beobachtet. *S. Ann. med. secund. p. 204.* Beyde waren schon seit mehreren Jahren mit dem böseartigen venerischen Frauenzimmertripper behaftet, die ausfließende Feuchtigkeit war ganz dünnjauchigt, sehr faul, und so scharf, daß sie die ganze Scheide und die Schamlezen zerfraß. Der Harn gieng immer nur mit einem Harnzwange ab. Durch viele Arzneyen blieb endlich bey der Einen der Frauenzimmertripper hinweg, und die Geschwüre der Scheide und der Scham schlossen sich; bey der Andern wurde derselbe feltner, und weniger beschwerlich. Beyde aber klagten doch über beständiges Brennen, und nagenden Schmerz in der untern Schmeerbauchgegend, zuweilen über große Beängstigungen, Gebärmutterzwang, und gegen die Schamweichen und die Mutterscheide sich erstreckende Schmerzen. Hierauf erfolgten

Heil

Die Heilungsart ist sehr schwer und ungewiß. Indessen muß man innerlich das Gumminqueßilber mit einem gesättigten Sarzaparilledekoft geben; äusserlich aber, mittelst eines silbernen Röhrchens, den Gebärmutter-

kleine Ohnmächte; es wurden mehrere, äusserst stinkende, Luftstöße mit grossem Geräusche, und der größten Gewalt vorne aus der Gebärmutter getrieben, und bald hierauf zeigte sich eine jauchigte, flockigte, wie Feuer brennende, zernagende Feuchtigkeits; die aber in kurzem wieder zu fließen aufhörte. Nach einem, zweyen oder dreyen Tagen stellten sich wieder die nämlichen Zufälle ein; es brach wieder Lust los, und wurde wieder höchst stinkende Feuchtigkeits gleichsam mit Gewalt fortgetrieben. Dieß währte durch mehrere Wochen, dann zeigte sich eine sehr harte, sehr elastische, und beynahe runde Geschwulst in der Weichengegend; sie schien aber nach jedem ausgetriebenen Luftstosse und Abflusse der gesagten Feuchtigkeits kleiner und weicher zu werden. Indessen nahm diese Geschwulst an Grösse doch nach und nach zu; aber je grösser sie wurde, desto seltner wurden auch die Luftstöße, und am Ende blieben sie vollkommen weg; nun wuchs aber die Geschwulst weit schneller und merklicher an. Beyde Kranken hatten ein unterbrochenes kleines Fieber; um den Abend zeigte sich starkes und öfteres Schaudern, und es erfolgte eine grosse Hitze mit unauslöschlichem Durste. Hierauf kam unruhiger Schlaf, Irrededen, und Sehnenzuckungen; endlich machte, nach langwähriger Auszehrung des Körpers, der Tod den Uebeln ein Ende. Die Zufälle waren bey beyden ganz ähnlich. Der Stuhlgang war durch die ganze Krankheit ungehindert, der Harn gieng aber immer mit einem Zwange ab, war brennend und stinkend.

Ben

muttermund offen halten, damit die scharfe Feuchtigkeit aus der Höhle herausfließen, und die Quecksilber-  
einspritzungen in die Gebärmutter gemacht werden  
können.

Des

Bei der Ersten, die durch den Gebrauch der Arzneymittel vom Frauenzimmertripper vollkommen befreiet worden war, fand man, bey der Leicheneröffnung, eine harte, elastische, und an Grösse einem Mannshaupte gleichkommende Gebärmutter. Da der Wundarzt mit dem Messerchen in die Höhle derselben trug, fuhr die Luft mit Angestämme heraus, und war äußerst stinkend: bey weiterer Untersuchung fand man eine jauchigte, sehr stinkende, Flüssigkeit in derselben. Die Substanz der Gebärmutter selbst war dünnhäutig, und die inneren Blättchen waren alle schwürigt, und brandigt. Der Gebärmuttermund war ganz verhärtet, zusammengewachsen, an dem gegen die innere Höhle gefehrten Theile aber angefressen. In der Scheide fand man verschiedene schwämmigte Auswüchse, und unzählige Narben,

Bei der Andern war die Gebärmutter aufgespannt, elastisch, aber viel kleiner, als bey der Vorigen: übrigens fand man eine ähnliche Jauche, und auch sehr viele, stinkende Luft. Die Gebärmutterhöhle war ebenfalls durchaus schwürigt, und zersessen, und auch in der Scheide fand man garstige Geschwüre. Der Gebärmuttermund war aber nicht verwachsen, aber mit klumpigem, polypösen Blute verpfropft; überdies von einer scharfen Jauche sehr zersessen. Die ganze Scheide und die Schamlippen waren um und um schwürigt.



## Venerische Krankheiten der Brüste.

( Morbi venerei mamarum. )

### Venerische Entzündung der Brüste.

( Inflammatio venerea mamarum. )

**E**s ist eine vom Lustseuchegift entstandene entzündungsartige Geschwulst an den Brüsten.

1) **E. des Brustwärtchens.** Gemeiniglich entsteht sie vom Stillen eines venerischen Kindes. Die Haut schwillt um das Wärtchen an, so daß dasselbe ganz verborgen wird.

2) **Brustdrüsen = E.** Es entsteht ein tief sitzendes, hitzendes, hartes Beulchen, welches einer Lustseuchebeule in den Schamweichen ähnlich ist. Es wird schwer zertheilet, und geht auch schwer in Vereiterung über. Zuweilen ist auch eine Verhärtung der Achselhöhlendrüse damit vergesellschaftet.

Die Heilungsart erfordert den innerlichen Gebrauch des Quecksilbers. Aeußerlich bedient man sich entweder einer Bähung aus dem mit der verdünnten Quecksilbersoluzion erweichenden Mehlen; oder man macht aus der nämlichen Vermischung mit hinzugesetzten Semelbrossaamen einen zertheilenden Breiumschlag.

Wenn

Wenn aber die Zertheilung nicht angeht , so muß man die Vereiterung befördern , und die Beule wie eine Lustseuchebeule in den Schamweichen behandeln.

## Venerisches Geschwür an den Brüsten.

( Ulcus venereum mammae. )

Es ist ein vom Lustseuchegift entstandenes Geschwür an den Brüsten.

1) G. oder Chancres, am Brustwärtzchen. Gemeiniglich entstehen sie vom Stillen eines venerischen Kindes , oder vom Ausaugen der Milch aus den Brüsten durch eine venerische Weibsperson. Sie greifen entweder das Wärtzchen allein , oder auch den dasselbe umgebenden Hof ( discus ) an.

2) Haut = G. Sie zersfressen die Haut und das Fett der Brust selbst in einem grossen Umfange , und entstehen mit einem vorhergängigen breiten Flecke von der allgemeinen , oder verborgenen Lustseuche.

Die Heilungsart erfordert , ausser dem innerlichen Gebrauche des Gummiquedäsilbers , äusserlich den Quecksilberbalsam , oder die balsamische Quecksilberauflösung.

## Venerisches Krebsgeschwür an den Brüsten.

( Carcinoma venereum mammae. )

Es ist eine harte, fest stehende, und mißfärbige vom Lustfeuchegift entstandene Geschwulst an den Brüsten.

1) Scirrhisches K. Es ist eine etwas harte, fest stehende, mißfärbige, verschlossene, oder aufgebrochene schwürigte Geschwulst an den Brüsten.

Man unterscheidet das venerische Krebsgeschwür von dem wahren Krebs in folgenden Stücken :

1. Der wahre Krebs nimmt gemeiniglich langsam, der venerische geschwind zu.

2. Die Härte ist bey'm wahren fast steinartig, bey'm venerischen elastisch, wie bey einer entzündungsartigen Geschwulst, und nicht tief sitzend.

3) Bey'm venerischen ist das Eiter gelbgrünliche bey'm ächten jauchigt, braun.

4. Der ächte Krebs wird vom Quecksilber ärger gemacht; der venerische geheilet.

Die Heilungsart erfordert den innerlichen Gebrauch des GummiQuecksilbers mit Mohnsaft, und dem Sarzaparilledekotr. Außerlich lege man das Quecksilber.

berpfaster und die Quecksilberauflösung über; wenn dieß nicht hilft, so muß man die Brust mit dem Messer ausrotten. \*)

2) Schwämmigte R. Es ist eine schwämmigte feststehende, vom Luftfeuchtegift entstandene Geschwulst.

Die Heilungsart erfordert das Gummi-Quecksilber mit dem saturirten Sarzaparilledekokt: nützt diese Heilungsart nichts; so muß die Ausrottung vorgenommen werden. \*\*) 3)

\*) Herr Sauvages sah bey einer venerischen Weibsperson f. *Nosol. Method. T. II. p. 549.* eine schwürigte, an Größe einem Kindeskopf übertreffende Geschwulst, durch den Gebrauch des Quecksilbers sehr bald zur Faustgröße gelangen; indessen konnte aber die Heilung doch nicht gänzlich vollendet werden, folglich mußte das Uibrige dieser Krebsgeschwulst ausgeschnitten werden. An der Brust eines schon lange Luftfeuchigten Mädchens sah er zwei hühnereingroße Geschwülste, die mit stehenden Schmerzen, und einer bis an die Achsel fortlaufenden knötigten Drüsenverhärtung begleitet waren. Diese wurden sammt den Kehlegechwüren, mit denen diese Person angesteckt war, durch den Sublimatgeist nach dreuen Monaten geheilet. Herr Vierchen war der Meinung, f. *Libell. de cancro*, daß alle kröpfartigen Verhärtungen von einem ausgearteten Luftfeuchtegift kämen; folglich wäre auch ein kröpfartiges und venerisches Krebsgeschwür eine, und das nämliche, und beyde würden auch durch das Quecksilber geheilet, welches ein anderes Krebsgeschwür nicht verträgt.

\*\*) Adolph Friderich Vogel, Chirurg. Wahrnehmungen, I. Samml. S. 26. erzählt eine Bemerkung von einem schwämmigten Auswuchse eines Brustwärtchens, die durch das Sarzaparilledekokt hinweggeschafft wurde.



3) Brandigtes R. Es ist ein brandigtes Geschwür, venerischen Ursprunges. Man erkennt es an dem Entstehen eines rothgelben Beulchens, welches bald in ein sehr tiefes, brandigtes, mit einem rothgelben Rande umgebenes, sehr stinkendes und schmerzendes Geschwür übergeht.

Die H. A. erfordert innerlich das Gummiqueecksilber mit der Fieberrinde; äußerlich hat der mittelst einer Charpie aufgelegte Sublimatgeist oder die Auflösung vom versüßten Quecksilber genützt. \*)

In=

---

\*) Herr Bierchen, s. Abhandl. von den Kennz. der Krebschäden, S. 82. 84. und 120. hat bloß durch den äußerlichen Gebrauch des gesättigten Sublimatgeistes, der aus vier Granen ägenden Sublimate und einer Unze Weingeiste gemacht war, mehrere solche Krebsgeschwüre geheilet. Er vermuthet, die Gattung des brandigten Krebses, welche insgemein *Noma* (Wasserkrebs) genannt wird, und die Wangen der Kinder so geschwind zerfrisst, wäre auch venerischen Ursprunges, und könnte also auch durch den Sublimatgeist geheilet werden. Dergleichen Krebse sind nach den Beobachtungen an dem Hodensack und Schamlefzen, durch diese nämliche Arzney geheilet worden.

## Innerliche venerische Krankheiten.

( Morbi venerei interni. )

### Venerische Fieber.

( Febres venereae. )

#### Einfaches venerisches Fieber:

( Venerea simplex. )

Es ist ein anhaltendes, hitziges, vom Lustseuchegift entstandenes Fieber.

Zuweilen entsteht es bald nach einem unreinen Beyschlaf ohne eine Ansteckung der Geburtstheile; zuweilen nach wieder verschwundenen Lustseuchebeulen, oder nach einem unterdrückten Tripper.

Dieses Fieber währet zuweilen 20, 30, und auch mehrere Tage; zuweilen hört es aber auch nach wenigen Tagen schon wieder auf. \*)

Dieses Fieber wird auf vierfache Art entschieden:

1) Durch einen häufigen und stinkenden Schweiß.

2)

---

\*) S. Freyh. von Störk *Praecepta med. practica* T. II. p. 131. und *Ann. medic. secundus*, p. 221.

2) Durch einen trüben , häufigen , stinkenden und brennenden Sarn.

3) Durch einen wiederkehrenden Tripper , oder weißen Fluß.

4) Durch eine venerische Absetzung an die Haut; daher entstehen Friesel, Kupferfärbige Flecke, und andere Hautkrankheiten; an die Eingeweide: daher entstehen brennende, langwüßrige Schmerzen an verschiedenen Eingeweiden; an muskulöse Theile: daher folgen auf das venerische Fieber Gliederreißen, und heftiger Hauptschmerz.

Die Heilungsart dieses Fiebers erfordert:

1) Aderlässe, wenn das Fieber heftig, oder eine Vollblütigkeit zugegen ist;

2) Ein antiphlogistisches abführendes Mittel;

3) Eine kühlende Saamenmilch;

4) Einen gesättigten Absud von der Sarzaparille, und den Bittersüßstengeln;

5) Gummiquecksilberpillen.

## Entzündungsartiges venerisches Fieber.

( Venerea inflammatoria. )

Es ist ein anhaltendes hitziges Fieber, welches eine venerische Entzündung begleitet.

Man bemerkt es beym Entzündungszeitraume des Lappens, bey Hodenentzündungen, bey Entzündungen der Vorhaut, der Vorsteherdrüse, der Lustseuchedrüsen in den Schamweichen, bey tripperartigen Augenentzündungen, und bey der Entzündung der Kehle.

Es fängt mit der Entzündung an, und hört mit ihr auf; bey der Nacht ist es immer heftiger

Die Heilungsart erfordert Ueberlässe, und einen Sarsaparilleabsud mit Salpeter und Gummiuueksilber.

## Schleichendes venerisches Fieber.

( Venerea lenta. )

Es ist ein kleines langwübriges Fieber, welches die venerische Auszehrung begleitet.

Es entsteht von einem verborgenen, oder offenen Geschwüre, aus welchem das Eiter in die Gefäße eingesogen wird. Folglich findet es sich bey Gebärmutter-, Lungen-, und Knochenmarkgeschwüren ein.



Die Heilungsart erfordert , das Geschwür zu heilen. S. venerische Litterschwindsucht.

**Venerisches galligtes Fieber.**  
( *Venerēa biliosa.* )

Es ist ein von einem galligten Unrathe in den ersten Wegen entstandenes Fieber , welches mit der Lustseuche Befallenen öfters anwandelt.

Es ist keine eigenthümliche , sondern eine zufällige ( *accessorius* ) Krankheit bey der Lustseuche.

Man erkennt es an der unreinen Zunge , dem Mangel der Eßlust , und der Gegenwart zur Erzeugung galligter Krankheiten geneigten Jahreszeit ( *tempestate biliosa.* )

Die Heilungsart erfordert Erbräch - Abführungen ( *emeto catharsin,* ) und dann gallverbessernde Arzneyen , z. B. das Tamarindenmark mit Weinsteinram. \*)

Des

---

\*) Herr Prof. Stoll, *Ration. medendi. P. II. p. 266. u. f.*  
Während dem Gebrauche des Quecksilbers habe ich den Unrath im Magen zuweilen entstehen ; zuweilen rege werden ( *turgere* ) gesehen.

# Venerisches Wechselfieber.

( *Venerea intermittens.* )

Es ist ein tägliches, drey- oder viertägiges, vom Lustseuchegifte entstandenes Fieber.

Gattungen sind :

1) Unmittelbares ( idiopathisches ) v. W. , welches vom Lustseuchegifte selbst entspringt. Diese Gattung weicht auf den Gebrauch der Fiebereinde nicht, und wird nur durchs Quecksilber gehoben. \*)

2) Zufälliges ( *accessoria* ) v. W. , welches von seiner eigenthümlichen Ursache entsteht, und Venerische überraschet.

Diese Gattung wird durch die mit dem Quecksilber vereinigte Fiebereinde geheilet. \*\*)

§ 3

Be-

---

\*) Herr Monroo erzählt in den *Essays d'Edimb. Vol. I. obs. 47.* Beispiele viertägiger vom Lustseuchegift entstandener Fieber; umsonst wurden Fieberarzneyen vorgeschrieben, den dadurch wurde die venerische Krankheit vielmehr verschlimmert; da aber das verfaulte Quecksilber vorgeschrieben, und damit, bis zum erfolgenden Speichelflusse fortgefahren wurde, hörte nach einer einzigen noch nachkommenden Anwendung das Fieber sammt den venerischen Zufällen auf. Aehnliche Beispiele berichtet Ballonius, *Oper. T. II. p. 97. u. 117.* und Deidier, *de morb. vener. obs. 4.*

\*\*) Wenn das Wechselfieber keineswegs vom Lustseuchegift entstanden, sondern nur eine zufällige Krankheit bey

## Venerische Krämpfe.

(Spasmi venerei.)

## Venerische Steiffucht.

(Tetanus venereus)

**E**s ist eine krampfartige Zusammenziehung aller Muskeln des Rückgrades, der Kinnbacken, und der Gliedmassen.

Gattungen sind :

1) St. von der allgemeinen Lustseuche; die man an der Gegenwart venerischer Zufälle erkennt.

Die Heilungsart erfordert das GummiQuecksilber mit Mohnsast, oder, wenn das Schlingen, wegen Zusammenziehung der Kinnbacken, unmöglich ist, Klystire aus GummiQuecksilber und Mohnsast; zugleich müssen bis zum erfolgenden Speichelflusse fortgesetzte Quecksilberfalsbeeinreibungen gemacht werden.

2)

---

der Lustseuche ist, dann muß man die Fieberarzney mit der Lustseucheheilenden vereinigen, um beyde Krankheiten zu gleicher Zeit zu bändigen. Von dieser Vereinigung habe ich und Andere die glücklichsten Wirkungen gesehen. S. Werlhof, *Oper. T. I. p. 133.* und Theben Unterricht für Wundärzte. S. 117.

2) St. von der verborgenen Lustseuche, die man aus lange vorher gegangenen venerischen Zufällen argwohnen kann. \*)

Die Heilungsart ist die nämliche, wie bey der vorigen Gattung.

### Venerische Fallsucht. (Epilepsia venerea.)

Es ist eine periodische Zusammenziehung (Konvulsion) des ganzen Körpers, mit einer Veraubung der Sinne.

1) F. von einem innern Knochenauswuchse der Hirnschaale. Man kann sie aus dem fest sitzen.

§ 4 den

---

\*) Riverius Oper. med. univers. Lugd. 1664. p. 130 obs. X. hat folgende Bemerkung aufgezeichnet. Nach einer Armabsezung und schon vernarbte Wunde erfolgte eine Steissucht; man wiederholte die Absezung, aber ohne Erfolg. Die Aerzte vermutheten, es könnte wohl etwa von dem vormals übel geheilten Tripper ein Lustseuchegift in dem Blute dieses Mannes verborgen seyn: zu diesem Ende nahmen sie die Quecksilbereinreibung vor, und nach erwecktem Speichelflusse wurde der Kranke von den Zuckungen befreuet. Weil aber das Quecksilber die auch von andern, als venerischen Ursachen erfolgte Steissucht heilet, so ist eben nicht ganz gewiß, daß dieselbe in diesem Falle der Lustseuche ihr Entstehen zu verdanken gehabt hat.



den Schmerze an irgend einem Orte unter der Hirnschaale vermuthen.

Die H. N. Man kann das Gummiquecksilber, und das Dekoft vom Seidenbaste (*maezeraeum*) versuchen. Man könnte auch, wenn alles nichts hilft, die Trepanation an dem schmerzenden Orte unternehmen.

2) F. von der verborgenen Lustseuche. Bey Kindern, die von einst mit der Lustseuche angesteckt gewesen Eltern erzeugt worden sind. \*)

Die H. N. Man versucht den Gummiquecksilbersyrop.

Be=

---

\*) S. Rosenstein, a. O. S. 650., und Bloch, a. O. S. 178. — Ich habe einen Knaben von 6 Jahren, der schon beynähe durch 3 Jahre fallstüchtig war, so daß die Anfälle zu bestimmter Zeit wieder kamen; überdies auch mit dem Kopfgrinde, und mit einem vierfachen Winddorne am Rücken der Hände und Füße behaftet war, durch den innerlichen Gebrauch des Gummiquecksilbers, des verflühten Quecksilbers (*aquila alba*) und des Asands in sieben Monaten, ohne ersolgenden Speichelfluß geheilet. Die Geschwüre des Winddornes wurden mit der balsamischen Quecksilberauflösung, und mit der Quecksilbersalbe verbunden. Alle zweyte Tage bediente er sich der Osnerschen warmen Bäder.

## Venerische Entkräftungen.

( *Adynamiae venereae.* )

## Venerische Mattigkeit.

( *Languor venereus.* )

Es ist eine vom Lustseuchegifte entspringende Ermüdung des ganzen Körpers.

1) M. von der verborgenen Lustseuche. Nachdem diese Krankheit schon durch 6 Jahre gewähret hatte, wurde sie endlich durch die Milchdiät, und die Quecksilbersalbeeinreibung (*hydrargyrosis*) geheilet. \*)

2) M. vom venerischen Fieber. Die Heilungsart richtet sich nach der Verschiedenheit des Fiebers. S. venerische Fieber.

## Venerische Lähmung der untern Gliedmassen.

( *Paraplegia venerea.* )

Es ist eine vom Lustseuchegifte entstandene Lähmung der untern Gliedmassen.

1) L. vom unterdrückten Tripper.

L 5

Die

---

\*) Sauvages, a. O. T. I. p. 805. und Greyh. van Swieten, Comment. T. V. p. 385.

Die Heilungsart erfordert, ausser dem innerlichen Gebrauche des Gummiquedfilbers, den Tripper durchs Einimpfen wieder herzustellen \*)

2) L. von einer Knochenbeule, oder irgend einem andern Fehler um das Rückenmark; 3. B. von einer in die Höhle des Rückgrades geschehenen venerischen Absetzung.

Die H. A. versuche man wie bey den venerischen Knochenbeulen.

Des

---

\*) Herr Sauvages, a. O. S. 799. sah einen vierzigjährigen schon seit vielen Jahren mit Schamtheilgeschwüren angesteckten Mann, welcher endlich, nach einem ungeschickter Weise unterdrückten Tripper mit einer unvollkommenen Lähmung der unteren Gliedmassen, so daß er kaum auf den Füßen stehen konnte, befallen wurde. Der Wundarzt rieth ein Halbbad (semicupium) aus Wasser, in welches, bis es weiß wurde, Bleyessig (liquor saturni) gegossen wurde. Dieß machte die Lähmung der unteren Gliedmassen vollkommen. Umsonst versuchte man die Quecksilbersalbeeinreibung, und den Gebrauch des ägenden Sublimats durch 2 Monate. — Ich sah einen drey und fünfzigjährigen Mann, welcher venerische Knochenbeulen hatte, und vom österreichischen Baadnerbad den Halbschlag bekam, aber doch durch den Gebrauch des Absudes der Bittersüßstengel und des Gummiquedfilbers geheilet wurde.

## Venerischer Halbschlag.

(Hemiplegia venerea.)

Es ist eine durchs Lustseuchegift erzeugte Lähmung der rechten, oder linken Seite des Körpers, vom Scheitel bis an die Fußsohle.

### 1) H. vom unterdrückten Tripper.

Die H. A. ist die nämliche, wie im vorigen Abschnitte, No. 1.

2) H. von einem Fehler an der Hirnschale oder im Gehirne. Diese Gattung ist z. B. von einer Knochenbeule an der innern Tafel der Hirnschale, oder von einer örtlichen Gehirnverhärtung, oder Vereiterung, oder von irgend einem andern Fehler entstanden. \*)

Die H. A. ist sehr schwer, und selten möglich: doch kann man das Quecksilber, und den Absud vom Seidenbaste, und von den Bittersüßstengeln versuchen.

Be-

---

\*) Levelling, Diff. de carie cranii militis, quondam veneri postea epileptici, tandem apoplexia defuncti.



## Venerische Schmerzen.

(Dolores venerei.)

### Venerischer Hauptschmerz.

(Cephalaea venerea.)

Es ist ein vom Lustseuchegifte entstandener Hauptschmerz.

Gemeinlich wird er am Abend heftiger, und bey der Nacht am heftigsten, als wenn, nach dem Ausbruche der Kranken, die Knochen der Hirnschaale zersprängen; gegen den Anbruch des Tages läßt er nach.

1) H. von der allgemeinen Lustseuche. Bey dieser Gattung sind zugleich allgemeine Glieder- und Knochenschmerzen zugegen: hauptsächlich hat dieser Schmerz an der Stirne, und am Genicke seinen Sitz.

Die H. V. erfordert den innerlichen Gebrauch des Gummiweissens, und der Lustseuche entgegen gesetzte Dekokte.

2) H. von einer Hirnschaaleknochenbeule. Man erkennet ihn an der Geschwulst, und an einem örtlichen, fest sitzenden Schmerze.

Die Heilungsart ist wie bey der Knochenbeule.

3) H. von der verborgenen Lustseuche. Bey dieser Gattung sind die übrigen venerischen Zufälle nicht zugegen; doch läßt sie bey der Nacht verstärkte Schmerz vermuthen, folglich erfordert:

Die H. M. das Quecksilber. \*)

## Venerischer Schlafmangel

( Agrypnia venerea. )

Es ist eine vom Lustseuchgiste, oder von venerischen Schmerzen entstandener Schlafmangel.

1) S. vom Schmerze. Venerische Schmerzen werden bey der Nacht, und durch die Wärme des Bettes vermehrt: sie fangen gegen Abend an, werden um Mitternacht unerträglich, und lassen gegen den Anbruch des Tages wieder nach.

Daher stehen Venerische, wegen den unerträglichen Schmerzen öfters bey der Nacht auf, legen sich auf den kalten Boden des Zimmers, und fangen erst gegen den Anbruch der Morgenröthe zu schlafen an. \*\*)

2)

---

\*) Herr Bloch hat, a. O. S. 178. eine fürtreffliche Bemerkung dieser Gattung.

\*\*) Mehrere Krankheiten, z. B. die fieberhaften, oder scharbockischen Schmerzen, werden bey der Nacht verstärkt; die

2) S. ohne Schmerzen. Venerische Personen können zuweilen nicht schlafen, ohne daß ein, wenigstens kein heftiger Schmerz zugegen wäre. Ich habe, bloß mit venerischen Flecken angestechte Kinder um Mitternacht mehrere Wochen hindurch schreien gesehen; welches vielleicht vom venerischen Jucken hergekommen seyn mag.

Die Heilungsart erfordert das Quecksilber.

### Venerischer Brustschmerz.

(*Pleurodine venerea.*)

Es ist ein vom Luftseuchegift entstandener Brustschmerz. (*thoracis dolor.*)

1) B. von einer Knochenbeule an den Rippen, oder am Brustknochen. Man erkennt ihn an einem örtlichen und fest sitzenden Schmerze an einer Rippe, oder am Brustknochen.

Die

---

diese werden aber durch ihre eigenthümlichen Kennzeichen von den Venerischen leicht unterschieden: S. Hrn. Trillers *Exercitat. de vespertina morbor. exacerbatione*, im 2. Bande seiner *Opusc. med.* — Vom Frühlings schleimfieber hat Herr Prof. Stoll das nämliche bemerkt; S. *Ratio med. P. II. p. 163.* Indessen ist auch gewiß, daß die venerischen Schmerzen zuweilen bey der Nacht nicht verstärkt werden, wie ich selbst einigemal beobachtet habe.

Die Heilungsart ist wie bey der Knochenbeule.

2) B. von der verborgenen Lustseuche: man vermuthet ihn wegen der nächtlichen Verstärkung:

Die H. A. erfordert das Quecksilber.

3) B. Von einer Verhärtung der Brustdrüse. Man erkennt ihn an einen stumpfen, fest sitzenden, Schmerze unter dem Brustknochen. S. beschwerliches Athmen.

### Venerischer Darmschmerz. (Kolik.)

(Colica venerea.)

Es ist ein vom Lustseuchegift entstandener Schmerz in den Därmen, oder im Unterleibe.

Zuweilen ist er ausgebreitet, zuweilen örtlich und langwüdrig.

1) D. vom unterdrückten Tripper, oder von einer zertheilten Schamweichenbeule: gemeiniglich ist diese Gattung entzündungsartig; folglich erfordert

die Heilungsart Ueberlässe, antiphlogistische Arzneyen, das Sarzaparilledekokt, und das Gummi-Quecksilber. \*)

2)

---

\*) S. Freyh. von Störk, ann. med. secund. p. 125.



2) D. von der verborgenen Lustseuche. Man vermuthet diese Gattung, wenn, nach einem unreinen Benschlafe, ein langwüßriger, bey der Nacht verstärkter Darmschmerz, ohne ein Merkmaal der Lustseuche an den Geburtsheilen, zugegen ist. \*)

Die H. N. erfordert das Gummiquedfilber mit einem starken Sargaparilledesoft.

### Venerischer Gliederschmerz. (Gliedersucht.) (Arthridis venerea.)

Es ist ein vom Lustseuchegift entstandener, heftiger, bey der Nacht hauptsächlich verstärkter Gliederschmerz.

Der venerische Gliederschmerz greift vielmehr den mittlern Theil der Knochen, und nicht so oft, wie andere Gattungen der Gliedersucht, die Gelenke selbst an.

1) G. von der allgemeinen Lustseuche. Sie findet sich nebst andern venerischen Zufällen ein; man erkennt sie leicht; sie wird auch, wenn sie nicht veraltet ist, durch das Gummiquedfilber geheilet. \*\*)

2)

---

\*) S. Herrn Siemerling, *Differt. de colica ejusque speciebus*, Goetting. 1778. p. 33. und Herrn Berger, *super Chirurgiae genuina indole allocatio*. Hamburgi.

\*\*) S. Herrn Herzog, *Diff. de morbo articulari, speciatim venereo*. Helmst. 1768. Diese schon veraltete Krankheit wurde durch das Gummiquedfilber geheilet.

2) G. von der verborgenen Lustseuche. Sie pflegt sich nach zertheilten Lustseuchebeulen, und vertrockneten Eichelgeschwüren einzufinden.

Die Heilungsart ist wie bey Tro. 1.

## Venerischer Muskelschmerz. (Rheumatismus.)

(Rheumatismus venereus.)

Es ist ein vom Gift der Lustseuche entstandener Schmerz an einem oder mehrern Muskeln.

Der venerische Muskelschmerz ist gemeiniglich örtlich, und wird bey der Nacht verstärkt.

Die Heilungsart erfordert das Gummiqueeßilber mit dem Holz- und Sarzaparilledekokt, sammt warmen Bädern.

## Venerischer Hüftschmerz.

(Ischias venerea.)

Es ist ein vom Lustseuchegift entstandener Schmerz in der Hüftgegend.

1) H. von einer zertheilten Lustseuchebeule. Zwenmal sah ich, aus dieser Ursache Schmerz um das Schenkelgelenk, sammt Hinken erfolgen.

Die H. A. erfordert das Gummiquedſilber, den Spießglang, die Sarzaparille. \*)

2) H. von der verborgenen Luſtſeuche. Aus der Erkenntniß der Urfache und der nächtlichen Verſtärkung hat man dieſes Uebel von allen andern Gattungen des Hüftſchmerzes zu unterſcheiden.

Die Heilungsart iſt wie bey der vorigen Gattung. \*\*)

Ve-

---

\*) Ich ſah zween Soldatenoffiziere, deren jeder wegen einer ohne Quedſilberarzneyen zertheilten Luſtſeuche einen Hinken mußte, und einem geringen Hüftſchmerz hatte. Den Einen, der ſeit 3 Monaten krank war, heilte ich beynahe in einem Monate, durch das Gummiquedſilber und abführende Mittel vollkommen. Der Andere hatte ſchon über 18 Monate ſtärkere Hüftſchmerzen, und bekam nun ein galligtes Fieber, welches eine Abſetzung an den leidenden Ort machte, auf die eine Gelenkvereiterung, eine Knochenzerfreſſung, und endlich der Tod erfolgte. — Ich habe auch eine Weibsperson geſehen, die wegen einer zertheilten Luſtſeuchebeule ſchon über zwey Jahre hinkte, übrigens aber ſich wohl und ohne Schmerzen befand. War etwa dieſes Hinken bloß von einer zurückgebliebenen Zuſammenziehung (*contractilitate*, — es ſollte aber *contractione* heißen; denn dieſe iſt widernatürlich, nicht aber erſtere —) der Muſkelfiebern?

\*\*) Bagliv ſagt, L. II. §. 2. p. 206. *Virum gravi iſchiade laborantem nuperrime curabamus, irritisque optimis praefidiis deſperabamus de ſalute recuperanda; cum*  
ve-

## Venerischer Knochenschmerz.

(Dolor osteocopus venericus.)

Es ist ein vom Lustseuchegift entstandener, die Knochen selbst einnehmender Schmerz.

I) K. von der allgemeinen Lustseuche. Dieser Schmerz ist sehr heftig, die Knochen gleichsam zerschmetternd; so daß die Kranken sagen, die Knochen zersprängen ihnen im Körper. Sein Sitz ist an der Stirne, im Genick, an den Schultern, den Armen, und Schenkeln, hauptsächlich aber an den Schienbeinen; so daß den armen Kranken auch das weichste Federbett ein brennender Ofen zu seyn dünkt. Die Nacht und die Wärme des Bettes vermehrt diese Schmerzen; gegen den Anbruch des Tages lassen sie nach.

Die Heilungsart erfordert das Gummiweinstein mit Wollsaft und mit der Lustseuche entgegen gesetzten Detoxen.

M 2 2)

---

vero per transennam nobis Aegrotus subindicasset, se viginti abhinc annis, bubonibus gallicis male affectum fuisse, statim suspicionem dedit, ischiadam a fomite gallico pendere; quapropter praescriptis decocto sarsaparillae, antimonio crudo, cortice nucum etc. paucis diebus interjectis, a gravi ischiade convaluit, non sine Adstantium stupore.



2) Festsitzender K. Er entsteht von einer Knochenbeule, oder einer Knochenzerfressung, oder einer Knochenverweichung.

Man erkennt ihn, an der Gegenwart dieser Krankheit, und heilet ihn durch die Hinwegschaffung derselben. S. Knochenbeule und Knochenzerfressung.

## Venerische Athembeklemmungen.

( Anhelationes venereae. )

Venerische Athembeklemmung; oder beschwerliches Athmen.

( Dyspnoea venerea. )

**E**s ist eine langwährige, vom Lustseuchegifte entstandene Hemmung des Athems.

1) A. von der verborgenen Lustseuche. Sehr selten ist sie ein Zufall der allgemeinen Lustseuche, öfters aber eine venerische verlarvte Krankheit. Zuweilen erzeugt dieses Gift Knochenauswüchse an den Rippen, oder es verdickt die Lungenlymphe, und erzeugt dadurch durch Verhärtungen und Eiterbeulen in den Lungen.

Die Heilungsart erfordert das Gummiqued Silber, mit auflösenden, der Lustseuche entgegen gesetzten Drogen.

2) N. von einem Fehler in der Luftröhre. Diese Krankheit hat man von der durchs Luftseuchegift angeessener Luftröhre entstehen gesehen: sie ist durch die Ausschneidung eines Knorpelringes der Luftröhre geheilet worden. \*)

2) N. von der angeschwollenen Brustdrüse. Bey vielen, an der Luftseuche verstorbenen Kranken, die bey ihrem Leben mit der Athembeklemmung behaftet waren, hat man die Brustdrüse angepflöpft, geschwollen und faul gefunden. \*\*)

### Venerischer Husten. (Tussis venerea.)

Es ist eine vom Luftseuchegifte entstandene rauchende und krampfartige Ausathmung.

1) H. vom unterdrückten Tripper. Diese Gattung entsteht von der in dem Luftröhrenkopf abgesetzten tripperartigen Materie.

Die Heilungsart erfordert das Gummiweiss, und Wiederherstellung des Trippers.

M 3 2)

\*) *Memoires de l'Acad. de chirurgie à Paris. T. I. p. 348.*

\*\*) *Lieutaud, historia anatomico-medica, T. II. p. 91 et 92.*

2) H. von der allgemeinen Lustseuche. Man erkennt diese Gattung an der Gegenwart venerischer Zufälle. Zuweilen ist sie mit einem Blutauswurfe verbunden.

Die H. N. erfordert das GummiQuecksilber mit dem Sarzaparilleabsude. Bey venerischen Brustkrankheiten ist der Sublimatgeist sehr schädlich.

### Venerische Heiserkeit.

(Raucitas venerea.)

Es ist eine rauhe und unbernehmlichere (obscura) Stimme, die dem Lustseuchegifte, welches den Luftröhrenkopf angegriffen hat, ihr Daseyn zu verdanken hat.

Gattungen sind:

1) H. von einer Verschwürung des Luftröhrenkopfes, wie man zuweilen bey den Leicheneröffnungen gefunden.

Die Heilungsart erfordert den innerlichen Gebrauch des GummiQuecksilbers mit dem Sarzaparilleabsude.

2) H. von der verborgenen Lustseuche. Ich habe einen Menschen gesehen, der lange mit venerischer Krähe, Heiserkeit, und Husten geplagt, am Ende  
aber

aber durch das Gummiquetsilber und gefrorene Speisen (cibis glaciatis: sollte es etwa: im Eise gekühlte Speisen, heißen?) von der Heischereit geheilet wurde.

---

## Venerische Ausflüsse.

(Profluvia venerea.)

## Venerischer Speichelfluß.

(Ptyalismus venereus.)

Es ist ein öfters Ausrünspern des Speichels oder Schleimes aus der Kehle.

Gattungen sind:

1) S. von Kehlegegeschwüren. Diese verursachen, durch den Reiz der Nerven der Schleim- und Speicheldrüsen, auch ohne gegebene Quecksilberarzneien, einen Speichelfluß.

Die Heilungsart erfordert, die Geschwüre zu heilen, S. schwürigte Bräune.

## Venerischer Afterzwang.

(Tenismus venereus.)

Es ist ein beständiger Reiz (cupiditas; bezeichnender wäre nifus, oder stimulus etc. gewesen)



zum Stuhlgange , wobey eine kleine Menge Schleim ausgesondert wird.

Gattungen sind :

1) Tripperartiger A. , von einer Entzündung der Vorsteherdrüse.

Die H. A. E. Entzündung der Vorsteherdrüse.

Venerischer Eiterfluß aus dem After.

( Proctorrhæa venerea. )

Es ist ein Ausfluß eines eiterförmigten Schleims oder eines wahren Eiters , aus dem After.

Gattungen sind :

1) E. von einem Mastdarmgeschwür , welches sich öfters auf die Vereiterung der Vorsteherdrüse findet.

Die H. A. erfordert die balsamische Quecksilberauflösung einzuspritzen.

2) Unschwürriger E. Ich habe einen mit Feigwarzen am After behafteten Jüngling gesehen , dem zugleich ein eiterförmigter Schleim aus dem Mastdarme aus-

ausfloß, er wurde durch die eben No. 1. gesagte Einspritzung geheilet.

## Venerisches Eiterharnen.

( Pyuria venerea. )

Es ist ein vom Lustseuchegift entsprungenes Harnen eines eiterhaften Harns.

Gattungen sind:

1) E. von einem Harnblasengeschwüre: man bemerkt diese Gattung, wenn die Höhle der Harnblase von einem venerischen Geschwüre angegriffen wird.

Die Heilungsart erfordert den innerlichen Gebrauch des Gummiuecksilbers mit Mohnsaft und mit dem wässerigten Myrrhenextrakte.

2) Tripperartiges E. Um das Ende des Trippers pflegen sich schleimigte oder eiterförmige Fäden im Harn zu zeigen.

Die Heilung dieser Gattung erfolgt von sich selbst.



## Venerische Auszehrungeu.

(Emaciationes venereae.)

## Venerische Vertrocknung.

(Atrophia venerea.)

**E**s ist eine Auszehrung des ganzen Körpers, ohne einen schleichenden Fieber.

1) Tripperartige, oder weißflüssige B. Beim chronischen Tripper der Männer, und chronischen Tripper der Weiber.

Die Heilungsart erfordert, auſſer der Hinwegſchaffung der Hauptkrankheit, magenſtärkende Arzneyen, und eine gute nahrhafte Koſt.

2) B. von verhärteten Gefröſedrüſen. Daß dieſe Drüſen vom Luſtſeuchegifte nicht-ſelten in ſcirrhöſe Verhärtungen verwandelt werden, die eine Auszehrung nach ſich ziehen; zeigen die Leicheneröffnungen der an der Luſtſeuche Verſtorbenen. \*)

3)

---

\*) S. des Herrn von Zeller *de partium corporis humani fabrica et functionibus. T. I. p. 362.*

3) R. von der verborgenen Lustseuche. Diese Gattung habe ich bey Leuten bemerkt, die, ehe sie von der Lustseuche noch vollkommen geheilet sind, den Gebrauch des Quecksilbers unterlassen. Denn, da sie das Gummiuecksilber mit dem Sarzaparilledekokt wieder zu nehmen anfiengen, wurden sie bald fetter.

## Venerische Schwindsucht.

(Tabes venerea.)

Es ist eine Auszehrung des Körpers mit einem schleichenden Fieber; aber ohne Husten, und Eiterauswurf.

1) S. von nächtlichen Schmerzen. Also pflegen Leute, die von venerischen Gliederschmerzen, Knochen Schmerzen, und Schlafmangel gequälet werden, sich bald abzugeben, und von einem kleinen hektischen Fieber angegriffen zu werden.

Die Heilungsart erfordert das Gummiuecksilber mit Mohnsaft, und ein Milchdekokt der Sarzaparille, und des Schwindsuchtmosses (lichen Islandicum.)

2) S. von einem venerischen Geschwüre. Z. B. von einer Gebärmutterverschwörung, einer Lungeneiterbeule, u. s. w. Eine venerische Eiterbeule in den Lungen macht daß die Kranken oft sehr langsam unter einem Fieber abgehen, bis sie dieselben am Ende tödtet.

Die



Die Heilungsart ist wie bey Nro. 1. Sie geschieht aber selten.

3) S. von einem Geschwüre im Knochenmarke. Man erkennt sie an einer kariösen Knochenbeule, oder an der innerlichen Knochenzerfressung.

Die Heilungsart erfordert, den angegriffenen Ort zu durchbohren. S. Winddorn.

4) S. von venerischen Knötchen, oder Verhärtungen in den Lungen. Diese Gattung verursacht zugleich beschwerliches Athmen, und wird gemeinlich tödtlich. S. beschwerliches Athmen.

### Venerische Schwindsucht mit Eiterauswurfe. (Phthisis venerea.)

Es ist eine Auszehrung des Körpers mit Eiterauswurfe, Husten, und einem schleichenden Fieber.

1) Lungeneiterschwindsucht. Man erkennt diese Gattung, die aus einem venerischen Lungengeschwüre entsteht, am vorhergegangenen schweren Athmen, und Auswurfe einer zähen eiterigten Materie, die sich nach venerischen Krankheiten einfindet.

Selten wird diese Gattung geheilet, vorzüglich wenn das Uebel schon veraltet ist.

Die

Die Seilung kann man mit dem Gummiqueeßsiber, und mit dem Dekokt der Sargaparille, und des Schwindsuchtmoses \*), sammt der Fieberrinde, Honig und Milch versuchen, Herr Norton lobt den mineralischen Moth.

2) Schlundteiterschwindsucht von um sich fressenden Schlundgeschwürcn. Man erkennt diese Gattung an der Heischerkeit.

Ungeachtet die Lungen bey dieser Gattung gesund sind, wirft der Kranke doch Eiter aus, und zehrt, unter einem schleichenden Fieber ab. Diese Gattung wird doch leichter, als die vorige, geheilet.

Die Heilungsart erfordert, den angegriffenen Schlund zu heilen. S. schwürigte Bräune.

### Von der Lustseuche bey Schwangeren.

Die Erfahrung lehrt, daß mit einem venerischen Tripper angesteckte Weibspersonen empfangen, und Schwangere, während der Schwangerschaft, von der Lustseuche angegriffen werden können.

In beyden Fällen wird das Lustseuchegift auch dem Kinde, durchs Blut der Mutter, mitgetheilt.

Lust.

---

\*) S. Herrn Reisse, *Diss. de lichene islandico*. Erford. 1772.

Lustseuchige Schwangere haben leicht Mißfälle. Die zu früh gebohrne Frucht hat, aber doch nicht immer, Zeichen der Lustseuche an sich.

Ich habe gefunden, daß man, nach vorhergegangener Alderlasse, Schwangeren das Gummiquedfilber sicher geben könne. \*) Es heilet die Mutter und das Kind zugleich von der Seuche.

### Von der Lustseuche bey Kindern.

Kinder können mit der Seuche, durch die Mutter, oder die Säugamme, vor oder nach der Geburt, angesteckt werden.

Folg.

---

\*) Weil das Quedfilber die monatliche Reinigung treibet, und der Speichelfluß die Mutter erschöpft, und dadurch dem Kinde die Nahrung entzieht; so rathen Viele, die Heilung der Lustseuche bey Schwangern aufzuschieben, bis die Geburt vorüber ist, um durchs Quedfilber nicht etwa einen Mißfall zu verursachen. Aber das Lustseuchegift steckt Mutter und Kind täglich ärger an, und verursacht auch öfters, ohne das ein Quedfilber gegeben worden wäre: den Abgang einer durch die Fäulniß verdorbenen Frucht; aus dieser Ursache denke ich, man sollte Schwangern das Gummiquedfilber geben; denn aus der Erfahrung weiß ich, daß diese gelinde Quedfilberzubereitungen leicht, und ohne Mißfälle zu verursachen, die Lustseuche bey Schwangern heilet. Von der Speichelfur aber, und von scharfen Quedfilberarzneyen kann man ohne Gefahr in der Schwangerschaft keinen Gebrauch machen.

Folglich ist sie bey Kindern angeboren, oder nach der Geburt überkommen..

1) Angebörne L. Dergleichen Kinder bringen kupferfärbige Flecke um den After, das Mittelfleisch, den Hodensack, oder die weibliche Scham, zuweilen auch über den ganzen Körper, mit zur Welt. Diese gehen nach einigen Wochen in oberflächliche, speckigte, um sich fressende Geschwüre über. Nicht selten wird die Kehle, und die Lippenecke zugleich angefressen. Daraus entsteht Heiserkeit, nächtliches Geschrey, Schlaflosigkeit, schweres Schlingen, Schwindsucht, der Tod.

Zuweilen kommen gleich, oder bald, nach der Geburt, Lustseuchebeulen, und bey Mädchen der Frauenzimmertripper mit venerischen Flecken zum Vorschein.

2) Verborgene L. Zuweilen werden Kinder von einer venerischen Mutter, ohne die gewöhnlichen venerischen Flecke, oder irgend ein anders sichtbares Zeichen zu haben, geboren, und scheinen durch 3—4 Wochen sehr gesund zu seyn; hierauf aber schwellen die Augenlider an, und es triefet eine grosse Menge weißgelbliche Materie aus denselben. Bedient man sich nicht sogleich gehöriger Arzneyen, so kommen auch an den Geburtstheilen venerische Flecke hervor. Folglich ist das Eitertriefen der Augen als das erste Zeichen der verborgenen Lustseuche bey Kindern anzusehen. S. Eitertriefen der Augen.



Zuweilen verursacht dieß verborgene Gift nach einigen Jahren Schlundgeschwüre, oder Kopsgrind, oder Kröpfgeschwüre, oder Fallsucht. S. verlarvte Krankheiten.

Aus diesem sieht man nun, daß es die ersten Wochen nach der Geburt nicht immer gewisse Zeichen giebt, nach denen man sagen könnte, ob ein neugeböhrenes Kind venerisch sey, oder nicht. \*)

3) Nach der Geburt überkommene L. Von gesunden Müttern gebohrne, aber von einer venerischen Säugamme gestillte Kinder bekommen im Schlunde, im Munde, an den Lippenrändern, Geschwüre; die Stimme wird heiser, das Schlingen unmöglich; endlich macht eine tödliche Abzehrung den Übeln ein Ende.

## Fünf

---

\*) *Journal de Médecine* T. XLIV. p. 207. In Paris ist ein besonderer Ort errichtet, aus welchem Müttern, die ihre Kinder nicht selbst stillen wollen, Säugammen angerathen werden. Die Wundärzte, denen die Aufsicht dieses Instituts obliegt, tragen die größte Sorgfalt, daß ja keine venerische Säugammen, oder keine venerischen Kinder an diesem Orte aufgenommen werden. Indessen ist es doch geschehen, daß ein mit der verborgenen Lustseuche angestektes Kind einer gesunden Amme übergeben wurde, durch dieses wurde aber auch die Amme selbst, und noch ein anderes, gesundes Kind angestekt. S. Gordone *Détail de la nouvelle direction du Bureau des Nourrices de Paris etc.* 1775. p. 16.

Fünf Methoden werden von den Schriftstellern, die Lustseuche bey Kindern zu heilen, vorgeschlagen.

1) Kleine Quecksilbereinreibungen am Kinde selbst. Man hat aber bemerkt, daß die Kinder dabey bald wassersüchtig werden, und sterben. \*)

2) An der venerischen, das Kind stillenden Mutter gemachte Quecksilbereinreibungen. Auch bey dieser Methode sah ich die Kinder an der Seuche sterben.

3) An der gesunden Mutter gemachte Quecksilbereinreibungen. Brüste einer gesunden Amme werden von einem venerischen Kinde bald angesteckt, und dann in kurzer Zeit zum Stillen untüchtig gemacht; sehr selten kann man überdieß, auch um vieles Geld, eine gesunde Amme für ein venerisches Kind bekommen.

4) An einer Ziege, die man an irgend einem Theile beschoren hat, gemachte Quecksilbereinreibungen. Eine solche Stillungsmethode ist sehr unbequem, und die Ziege geht sammt dem Kinde, bald zu Grunde.

5) Versüßtes Quecksilber (*aquila alba*) oder eine andere Quecksilberzubereitung, welche man dem

---

\*) Levret *l'Art des Accouchemens*, Paris 1761. p. 267.

dem Kinde , oder der Amme , innerlich giebt. Diese Präparaten verursachen bey Kindern einen tödtlichen Durchfall , oder einen ähnlichen Speichelfluß.

**Meine Methode.** Ich gebe der venerischen Mutter , wenn sie ihr Kind stillen kann , Pillen aus Gummi-quecksilber , sammt einem starken Sargaparilledekoft ; dem Kinde aber zugleich Frühe und Abends ein Kaffee-löffelchen Quecksilbersyrop.

Auf diese Art habe ich mehrere Kinder sehr glücklich , mit und ohne das Stillen durch die Mutter oder eine Amme , geheilet.

Zugleich habe ich bemerkt , daß schon im Leibe der Mutter angesteckte Kinder , durch Quecksilber welches der schwangern Mutter gegeben worden , geheilet werden können. \*)

Von

---

\*) Ich habe mehreren venerischen Schwängern das Gummi-quecksilber gegeben , und gesehen ; daß sie doch vollkommen gesunde Kinder gebahren. Einmal sah ich doch im wienerischen Krankenhause zum S. Markus , wo ich damals der Entbindungskunst noch oblag , ein Kind , dessen Hals vorne so sehr angeschwollen war , daß er dem Kopfe selbst gleich kam : es war von einer venerischen Mutter geboren , die doch während der Schwangerschaft eine grosse Menge des van Swietenischen Quecksilbergeistes genommen hatte , und starb bald nach der Geburt. Hat etwa das Quecksilber , weil es bey diesem Kinde noch in der Mutter Leibe den Speichelfluß nicht erwecken konnte , diese Geschwulst aus dieser Ursache hervor

## Von der verborgenen Lustseuche.

Das Lustseuchegift bleibt zuweilen lange im Körper verborgen, ohne irgend eine Krankheit zu erwecken.

Die verborgene Seuche giebt sich durch kein Zeichen zu erkennen, und steckt durch den Bey Schlaf zuweilen doch an. \*)

N 2

Die

---

vor gebracht? Es ist mir sehr leid, daß ich das Innere dieser Geschwulst im Leichname des Kindes nicht untersuchen konnte. — Endlich zweifeln noch Andere, ob auch das der Schwängern gegebene Quecksilber in die Frucht selbst eindringe; Herr Levret hat aber beobachtet, ang. Ort. S. 46. daß die Feuchtigkeit, die im sogenannten Schafhäutchen (amnion) enthalten, bey Schwangeren, an denen während der Schwangerschaft Quecksilbereinreibungen vorgenommen wurden, grau ist; und das rothe Kupfer (wegen dem mit sich führenden Quecksilber) weiß macht: S. 421. S. 73. sagt Hr. Levret noch, die Darmunreinigkeiten eines solchen Kindes wären bleifarbig. Folglich ist es klar, daß das Quecksilber von der schwängern Mutter in das Kind übergeht.

\*) Herr Goulard hat in seinem *Oeuvres de Chirurgie*, 2. B. S. 19. diesen Satz durch eine sonderbare Beobachtung bewähret. Eine Weibsperson hatte eine Hautkrankheit von der Klasse der Ausschläge, die Knötchenförmig war, überdies an verschiedenen Theilen des Körpers Geschwüre. Da ihr Ehemann vor 15 Jahren Lustseuchebölen und venerische Schamtheilegeschwüre gehabt hatte, so vermuthete Goulard, es stecke hier etwas vom Lustseuchegifte verborgen. Diese Weibsperson war auch einmal durch den Gebrauch von Quecksilberarzneyen geheilet



Die Zeit, durch welche das Lustseuchegift, ohne noch sein Daseyn durch Krankheiten anzukündigen, im Körper verborgen bleiben kann, ist ungewiß. \*)

Wenn

---

let worden; weil man aber ihren Ehemann nicht berechnen konnte, das im Körper verborgene Gift durch die gewöhnliche Mittel vertilgen zu lassen, so wurde sie wieder angesteckt, und mußte auch endlich die Hartnäckigkeit ihres Mannes mit dem Tode bezahlen. Er lebte noch 25 Jahre nachher, ohne den geringsten Zufall irgend eines verborgenen Giftes zu empfinden. — Herr Pressavin ist auch ein eifriger Vertheidiger dieses Satzes: S. dessen *Traité des Maladies Veneriennes*, Genève 1773. in welchen Werke er, S. 22. folgende Bemerkung erzählt:

„ On connoit une femme mariée; on en recoit du  
 „ virus: son mari, qui la connoit habituellement, ne  
 „ se plaint d'aucun accident, et en effet n'en éprouve  
 „ aucun. On est tenté de croire cette femme saine;  
 „ cependant elle porte dans son sang le virus, qu'elle  
 „ a reçu de son mari, quoique ce dernier ne repren-  
 „ ne pas avec elle les accidents, qu'il lui a d'abord  
 „ communiqués; elle n'est pas moins susceptible de  
 „ les transmettre à tous ceux, qui auroient un com-  
 „ merce avec elle. J'ai vu plusieurs jeunes gens dans  
 „ pareil cas; ils ne pouvoient se persuader, que des  
 „ symptomes très-caractérisés du virus vénérien eus-  
 „ sent aucun rapport avec cette maladie; parceque,  
 „ disoient ils, ils savoient positivement, que la fem-  
 „ me, avec laquelle ils avoient eu commerce, cou-  
 „ choit ordinairement avec son mari, et que ce mari  
 „ ne se plaignoit, et n'avoit en effet aucun des acci-  
 „ dents, dont ils étoient atteints. “

\*) Ich sah, daß ein adeliches Frauenzimmer, die von einer venerischen Ulme gestillt worden war, im 13ten Jahre des Alters, da sich das Monatliche am ersten zeigte,

gäbe

Wenn sichs argwöhnen läßt, daß es zugegen sey, wie z. B. bey von einer venerischen Mutter gebohrnen, oder von einer solchen Amme gestillten Kindern; oder bey Erwachsenen, die einst eine venerische Krankheit gehabt haben, oder wenn man, nach dem Beyschlaf mit einer für gesund gehaltenen Person, sich angesteckt findet; so muß man alsogleich das Gummiuacfilber mit dem Dekoct der Sarzaparille und der Bittersüßstengel, die das venerische Gift zu entwickeln gerühmt werden, \*) gebrauchen.

N 3

Von

gähe mit einem sehr scharfen Frauenzimmertripper, und sehr bössartigen Kopfgeschwüren, die auf den Gebrauch des Quecksilbers wichen, befallen wurde. Gleichwie das Miasma der Masern, der Pocken, und des Wasserscheues vor seinem Ausbruch zuweilen lange im Körper verborgen seyn kann; eben so hat man das nämliche von dem Venerischen angemerket. Herr Rosen von Rosenstein hat dieß in der Anweisung zur Kenntniß und Kur der Kinderkrankheiten, Götting. 1774. S. 652. u. 671. mit mehreren Bemerkungen erwiesen. Ein zweyjähriges Mädchen, welches durch die venerische Amme, die demselben die, in ihrem Mund vorher gekäueten Speisen gab, angesteckt wurde; verspührte erst nach zehn Jahren die Wirkung der Ansteckung. Zwey andere Geschwister erfuhren erst in ihrem dreyßigsten Jahre die Folgen der Ansteckung von ihrer Amme. Herr Rosenstein sah, daß ein Kind bis ins eilfte Jahr gesund blieb, dann aber zeigten sich, nach glücklich überstandener Pockeneinimpfung, die Zeichen der Lustseuche. Denn es war von der Mutter, die einst damit befaßt gewesen war, angesteckt worden: a. O. S. 654. S. auch Freyh. van Swieten, 5. B. S. 385.

\*) Sauvages Nosolog. method. T. II. p. 549.

## Von der verlarvten Lustseuche.

Das entweder verborgene, oder offenbare Gift der Lustseuche erzeugt zuweilen Krankheiten, die in der Lustseuche nicht gewöhnlich vorzukommen pflegen. \*)

Gewöhnliche venerische Krankheiten sind: Tripper, Geschwüre an den Geburtscheilen, und im Schlunde, Feigwärzen, Vorhautgeschwülste, Lustseuchebeulen, Knochenbeulen, kupferfärbige Flecke, Gliederschmerzen, nächtliche Hauptschmerzen.

Ungewöhnliche Krankheiten sind: Venerisches Fieber, Husten, Kolik, Mattigkeit, Lähmung, Fallsucht, Abzehrung, u. s. w.

Es ist fast keine Krankheit, unter die sich die Lustseuche nicht verlarven sollte.

Man erkennt diese Krankheiten, wenn

1) eine erwachsene Person eingesteht, sie habe einst einen Tripper, ein Eichelgeschwür, oder eine Schambeule gehabt; oder wenn

2) der Vater, die Mutter, oder die Amme derselben angesteckt waren; oder wenn

3)

---

\*) S. die sehr gut geschriebene Dissert. des Herrn Sausmann, de morb. venereis larvatis. Götting. 1778.

3) Die Krankheit allen gewöhnlichen Mitteln widersteht.

4) Wenn dieselbe um Mitternacht schlimmer wird, und gegen den Tag nachläßt. \*)

5) Wenn nach dem Gebrauche des Quecksilbers die Zufälle gelinder werden.

Alle diese Zeichen zeigen aber, nur muthmaßlich, nicht vollkommen gewiß an, daß die Krankheit dieses Kranken dem Lustseuchegifte ihr Daseyn zu verdanken habe.

Die Heilungsart einer solchen verdächtigen Krankheit erfordert den Gebrauch des Quecksilbers, und anderer dem Lustseuchegifte entgegen gesetzter Mittel.

### Von der mit einer andern Krankheit vereinigten Lustseuche.

Die Lustseuche kann man mit einer jeden andern Krankheit verwickelt antreffen.

---

\*) Doch bemerkt man diese nächtliche Krankheitsverstärkung nicht in allen venerischen Krankheiten, wie ich und Andere gefunden haben. S. Blochs Bemerkungen, S. 481.



Eine solche Verwicklung macht die Erkenntniß und Heilungsart beyder Krankheiten nicht selten dunkel und schwerer.

Am öftersten ist die Lustseuche verwickelt

1) mit dem Scharbocke. Wenn ein Scharbockischer zugleich venerisch ist, so hält es mit der Kur der Lustseuche sehr schwer; weil das Quecksilber bey Scharbockischen wie ein Gift wirkt. \*) Folglich

erfordert die Heilungsart bey Storbutisch = venerischen vom Anfange antisthorbutische Mittel; hierauf muß

---

\*) Das der Gebrauch des Quecksilbers Scharbockischen schädlich ist, hat Herr Grainger durch mehrere Beobachtungen erwiesen. Bey einem scharbockisch = venerischen Soldaten sah er von einem einzigen Quentchen der demselben eingeriebenen Quecksilbersalbe einen blatigen Speichelfluß, ein Anschwellen der Zähne. (Grainger sagt: *Dentium infirmitas ingens sequebatur; fere omnes excreavit, et quod mirum, mole auctos*) und ein Hinwegräuspfern des im höchsten Grade faulen Zahnfleisches, mit Ohnmächten und einer sehr grossen Entkräftung. *S. Hist. febris anomala Batave. p. 6. in den angefügten Monitis siphyliticis.* Der berühmte Stabsmedikus Herr Kramer sagt, es wären 400 scharbockische Soldaten durch den Gebrauch des Quecksilbers elend umgekommen. Herr Goulard sah, daß zweien scharbockische Soldaten, die man in ein Zimmer, in welchen einige Venerische durchs Quecksilber geheilet wurden, gelegt hatte, bloß von dem Dampfreise der den Speichelfluß habenden, Anschwellung des Kopfes, heftigen Speichel-

muß man das Gummiuecksilber mit Mohnsaft \*) nach und nach denselben beymischen. Vorzüglich dienlich ist der Malzaufguß mit dem Saft von der Kresse, des Löffelkrautes, oder der Bachbungen.

Die Kniezusammenziehung, die bey Leuten, welche mit dem verborgenen Scharbock behaftet sind, zuweilen auf den Gebrauch des Quecksilbers erfolgt, wird durch die nämlichen antisthorbutischen Mittel, und besonders durch die aufgelegten gequetschten Blätter von *sedo acri* sehr gut geheilet.

2) Mit Kröpfgeschwülsten. Venerischkröpfigten kann man das Quecksilber sicher geben. Pillen vom mineralischen Moör mit antiscrophulösen Arzneymitteln

N 5

wer-

chelaß, und sehr böse Mundgeschwüre bekamen. Aber kein Schriftsteller hat die tödtliche (deleterius) Wirkung der Quecksilbersalberinreibung bey Scharbockischen, oder Scharbockisch-venerischen deutlicher erfahren, als der gelehrte Soldatenwundarzt, Herr Sempel; welcher vom Gebrauche des Quecksilbers bey denselben die Wangen durch den Brand verzehret, und den Tod selbst erfolgen sah. S. Sempel Erfahr. und Wahrnehm. v. Scharbocke, 1778. S. 26.

\*) Medicinische Beyträge I. Th. p. 296 der berühmte Michaelis sagt: viele, die den Scharbock und die Lustseuche zugleich hatten, wurde durch Mohnsaft, Fiebertinde und Vitriolsäure von beyden Uebeln ohne Quecksilber gründlich geheilet.

werden von Vielen wider die Kröpfgeschwülste gar sehr gerühmt.

3) Mit dem Ausfage. Von dieser Verwicklung f. venerischer Ausfag.

4) Mit der Krätze. Venerische Geschwüre werden bey Krätzigen durch den Gebrauch des Quecksilbers meistens verschlimmert. Daher muß man vorher die gegenwärtige oder verborgene Krätzenscharfe durch den mineralischen Mohr, Schwefelblumen mit etwas Kampfer, Hollunderthee und andere in der Krätze specifischen Mitteln tilgen, und den das Quecksilber geben.

5) Mit einer hitzigen Krankheit. Wenn ein Entzündungs = ein galligtes, oder ein säuligtes Fieber einen Lustseuchigten befällt, so kömmt er selten mit dem Leben davon.

Die Heilungsart muß man nach der Hauptkrankheit einrichten.

Die Lustseuche beschützt nicht, wie Einige geglaubt haben, vor der Pest. \*)

6)

---

\*) Herr von Mertens in dem schönen Werkchen *Observ. medicæ de febribus putridis et peste. Vindob. 1778. p. 182.*

6) Mit Krankheiten von übertriebenem Bey-  
schlase. Diese finden sich nicht selten bey Venerischen  
ein. Von unmässiger Saamenergießung entstehen Kräf-  
teverlust, Gehirnschmerzen, Follsucht, Stumpfheit aller  
Sinne; hauptsächlich Schwäche des Gesichts, schwar-  
zer Staar, Rücken- und Lungenauszehrung, heftische  
kleine Fieber, tripperhafte Saamenergießungen (pol-  
lutio) hauptsächlich bey der Nacht.

Man erkennt diese Krankheiten aus der Erzählung  
des Kranken, aus den vor der Lustseuche gehenden Zu-  
fällen, aus der Schlappigkeit des Hodensackes, u. s. w.

Die Heilungsart erfordert, ausser einer kleinen  
Dosis des Gummi-Quecksilbers,

1. sich vom Beyschlase und Selbstbefleckungen zu  
enthalten.

2. Eine Kost aus sehr leicht zu verdauenden Spei-  
sen; z. B. aus Reis, Gallerten, Milch; vorzüglich  
nützt das Schwindsuchtmoos.

3. Einen Trank aus Sargaparille und Gerste  
mit Milch.

4. Die Landluft.



5. Die Fiebrerrinde mit Eisen, der Zimmtinfur, und bitteren Magenarzneyen; wenn diese das kleine auszehrende Fieber nicht verbeut.

6. Kalte Bäder, die den geschwächten Körper aufs thätigste stärken.

7. Mit vom Quecksilber verursachten Krankheiten. Die Wirkungen des gegebenen Quecksilbers muß man wohl von den Wirkungen des Lustseuchegiftes unterscheiden, damit nicht ein Unbehutsamer, die Quecksilberzufälle für venerische Krankheiten haltend, die Quantität der Quecksilberarzneyen verstärke, und den Kranken zu Grunde richte.

Die allgemeinen Wirkungen des allzu reichlich gegebenen Quecksilbers sind:

1) Beschleunigter Blutumtrieb, so daß der Aderschlag zuweilen auf 120 — 130 Schläge (in einer Minute) steigt.

2) Blutausdehnung (rarefactio) daraus erfolgt unächte Vollblütigkeit (plethora) und Entzündungsfieber; die man bey'm Anfange der Heilung mit Quecksilberarzneyen öfters bemerkt.

3) Faulartige Blutauflösung; daher kommt bey'm Fortgange der Kur zuweilen ein faulartig galliges Fieber,

ber, mit Blutflüssen, und der Tod selbst; oder Scharbock mit Knieemattigkeiten und blutendem Zahnfleische; daher kommen Gestank des Mundes, des Harns und des Schweißes; wie auch blutiger Speichelfluß.

4) Unmäßiger Speichelfluß; daher wird der Körper erschöpft, schwach, zuweilen in allen Gelenken zusammen gezogen; daher kommt auch Luftröhrenkopfentzündung (cynanche) mit sehr bösartigen Geschwüren um die Mündungen der Speichelgänge an der innern Oberfläche der Backen und unter der Zunge; daher erfolgt endlich Erstickung und der (gähle) Tod der Speichelnden. Zuweilen bleibt eine Verengerung (contractura) der Rinnsack und eine Aneinanderwachsung der Backen mit dem Zahnfleische nach ausgehaltenem Speichelflusse zurück.

5. Absetzungen des Quecksilbers an verschiedene Orte, vorzüglich aber in die Knochen. Aus diesen entspringen rheumatische oder Knochenschmerzen, Zittern, Blutspenen, Mattigkeit, Schlagaderbrüche, Fallsuchten, und andere langwährige Krankheiten.

Aus diesen sieht man, daß die vom Quecksilber erzeugten Krankheiten in entzündungsartige, faulartige und langwährige eingetheilt werden können.

Die entzündungsartigen, z. B. das Entzündungsfieber und die Luftröhrenkopfentzündung (cynanche) erfordern,

1) sich von allen Quecksilberzubereitungen zu enthalten ;

2) Uderlässe ;

3) antiphlogistische , gelind abführende Arzneyen ;

4) eine mit Salpeter versetzte Saamenmilch ;

5) Gerstenabsud mit Salpeter und arabischem Gummi.

Faulartige Krankheiten , z. B. Faulfieber , stinkende Mundgeschwüre , und Quecksilberscharbock ( scorbutus mercurialis , ) erfordern ,

1) den Gerstenmalzaufguß , mit antiskorbutischen Säften ;

2) die Fieberraude ;

3) eine Kost aus Speisen aus dem Gewächsreiche.

Langwährige , vom im Körper zurück gebliebenen Quecksilber erzeugte Krankheiten , z. B. Gelenkbänderzusammenziehung , Rheumatismen , Zittern der Muskeln , erfordern zu ihrer Heilung , den antiskorbutischen Arzneyen noch hinzu zu setzen ,

1)

1) warme, auf fünfzigmal wiederholte Bäder; \*)

2) schweißtreibende Arzneyen, z. B. den Absud der Alland- oder der Meistervurzel, die Essenz der Vibernelwurzel, und hauptsächlich den Speißglang. \*\*)

3)

\*) Leute, die in den Irdischen Quecksilbergruben arbeiten, werden sehr bald vom Speichelflusse angegriffen; fängt aber dieser nicht an, so bekommen sie sogleich durch den ganzen Körper herumirrendes Gliederzittern. Bäder, schweißtreibende und abführende Arzneyen sind die einzigen Hilfsmittel, durch welche dieselben die Gesundheit wieder erlangen. Man findet auch am Boden der lange gebrauchten Bäder immer laufendes Quecksilber. Einige Schriftsteller berichten, man hätte auch in den Bädern derjenigen Personen, die von dem allzustarken Gebrauche salziger Quecksilberzubereitungen Zittern der Glieder bekommen haben, laufendes Quecksilber gefunden. Wir sehen ferner sagt Herr Prof. Adolph Murray, daß alte Leute, Kinder und kaltsäftigere (frigidioris naturae) Personen, wie auch Frauenzimmer mit Zittern, Andere aber, die ein hitzigeres Blut, und aus dieser Ursache auch die Quecksilberkugeln leichter zertheilen (subigere) können, vielmehr mit dem Speichelflusse befallen werden. S. Herrn Dubb angef. Differt. S. 9.

\*\*) Ein schon lange venerischer durch vielmal gegebenes Quecksilber nun ausgezehrter, sehr gliedersüchtiger, an der Nase und an andern Orten mit Geschwüren angegesteckter Soldat, empfand von allen angewandten Quecksilberzubereitungen schlimmere Wirkungen. Herr Doktor de Vega schrieb diesem Elenden vor, täglich sieben Graue rothen Speißglang mit einem Quentchen Zucker zu neh-



3) Zuweilen abführende Mittel;

4) Milch, und bey Auszehrenden die Milchdiät.

## Von der Verhütung der Lustseuche.

(De Luis venereae Prophylaxi.)

Ein Arzneymittel, durch welches man verhindern könnte, daß ein gesunder, einem weißflüssigen, oder mit einem Geschwüre in der Gebärmutterseide behafteten Frauenzimmer beyschlafender Mann vom Lustseuchegifte nicht angesteckt, oder, wenn er nun angesteckt ist, von dem Miasma alsogleich wieder befreuet würde, hat man bis iht noch nicht entdeckt. \*)

Die Abwaschung des männlichen Gliedes gleich nach dem Beyschlaf kann zuweilen nützen, wenn das venerische Miasma noch nicht in die Schleimhöhlen  
der

nehmen; die Dosis des Spießglanzes wurde nach und nach auf 40 Grane täglich verstärkt. Zum Kranke gab man ihn den Holzabsud. Der Kranke bekam nach einigen Tagen eine starke Ruhr, an den übrigen Tagen schwigte er täglich häufig, die Gliedersucht ließ vollkommen nach, die Geschwüre wurden mit dem Brennkrautpulver (pulv. flammulae Jovis) bestreuet, und giengen in eine gute Eiterung über; die angefressenen Nasenknochen blätterten sich ab, und der Kranke war nach einigen Wochen wieder gänzlich hergestellt.

\*) Astruc de morb. venereis. cap. 2. §. 2.

der Harnröhre eingebracht ist : gemeiniglich wird es aber sehr bald den Oeffnungen derselben eingesogen.

Beobachtungen bey Kranken haben mir gelehret, daß die verschiedenen feinen Künste, deren sich gewisse Leute zu dieser Absicht zu bedienen pflegen, die Ansteckung nicht verhindern.

Die Einsprizung der mit Wasser verdünnten Seifensiederlauge \*) oder des Zitronensaftes, gleich nach dem Beyschlafe, und andere von verschiedenen Schriftstellern ausgeposaunte Arzneyen, haben, wie die Erfahrung zeigte, am Ende ihrer Erwartung nicht entsprochen. \*\*)

Noch

\*) S. Herrn Kern *Diff. de infallibili remedio prophylactico siphyleos*. Friburg. 1777.

\*\*) Hr. Gall hat in seiner *Diff. sist. critecen prophylaxeos siphylidis* Friburg. 1777. von allen diesen Vorbauungsmitteln umständlich und gelehrt gehandelt. Ich habe einmal gesehen, daß das neue Mittel des Herrn Peyrillhe, nämlich das flüchtige Laugensalz, welches zur Heilung der Lustseuche angerühmt wird, eine sehr böse Wirkung gehabt hat. Das nämliche hat auch Herr Prof. Adolph Murray beobachtet, welcher mit der von Herrn Peyrillhe vorgeschriebenen Dosis dieses Mittels bey einem bösartigen und schon veralteten Tripper einem Versuch machte. Der Kranke empfand darauf sehr heftiges Harnbrennen, und es gieng sogar Blut mit dem Harn ab. Herr Murray ließ also zugleich eine reichliche

Men.

Noch mehrers läßt sich von der sehr schwachen Auflösung der Quecksilbersolution, oder des Gummi-quecksilbers mit Milch vermischt, und als ein Bad, oder eine Einsprizung gebraucht, hoffen; aber auch dieß muß noch durch mehrere, und zu diesem Ende unternommene Versuche geprüft werden. Folglich ist die Enthaltung von venerischen Ausschweifungen noch die einzige Beschützung vor dem venerischen Uebel.

---

Menge schleimigter Abkochungen trinken; aber am folgenden Tage war der Tripperabfluß gehemmt, und die linke Hode entzündet. Zu einer andern Zeit schrieb er einem mit venerischen Geschwären heftig angesteckten Jüngling diese nämliche Arzney, doch etwas behutsamer vor; die Geschwüre fiengen aber an, bey verstärktem Schmerze entzündet zu werden, und der Kranke klagte über so grosse Unruhe, daß man den fernern Gebrauch unterlassen mußte. S. Herrn Dubb, angef. Diff. S. 5.

---



## FORMULAE REMEDIORUM IN HOC OPUSCULO LAUDATORUM.

---

### FORMULAE INTERNAE.

#### 1. *Solutio mercurii gummosi.*

R. **M**ERCURII vivi depuratissimi ℥j.  
Gummi arabici pulverisati ℥iij.  
Syrupi cichorei cum rheo. q. s.

Conterantur in mortario vitreo, sensim adfundendo aliquantum syrupi, donec mercurius omnis abiit in mukum. His satis subactis addantur sensim conterendo.

Aquae rosarum ℥xij.

Detur in ampullam vitream. S. mane ac vespere duo cochlearia lignea mensualia assumantur.



Usus, Haec solutio in omnibus morbis venereis primum remedium internum est, quod cito, tuto ac jucunde miasma venereum delet. Raro salivam movet, si omni decimo die pilulae purgantes vel pulvis purgans exhibeatur. Solutio ex cochleari ligneo assumi debet, cochleari enim argenteo vel metallico mercurius adhaeret. Quibus saliva moveri incipit, hi assumant purgans et aliquot dies a solutione abstineant.

## 2. Pilulae ex mercurio gummoso.

R. Mercurii vivi depuratissimi ℥j.  
 Gummi arabici pulverisati ℥iij.  
 Syrupi cichorei cum rheo. q. s.

Conterantur bene in mortario marmoreo vel vitreo, donec mercurius omnis in mucum abiit, huic adde

Micae panis albissimi ℥β.

Subigantur bene in massam pilularem. Fiant pilulae gr. iij. conspergantur pulvere liquiritiae.  
 D. S. mane ac vespere assumantur pilulae x.

Usus. Commodior harum pilularum, quam solutionis assumptio est, hinc ab aliquod jam annis

nis frequentissime his pilulis magno cum effectu utor. Jam a duobus annis ℥β opii depurati admisceo, et pilulas e mercurio gummoso - opiato voco.

### 3. Syrupis mercurialis.

℞. Mercurii vivi depuratissimi. ℥j.

Gummi arabici pulverisati. ℥iij.

Syrupi cichorei c. rheo. q. s.

m. conterantur in mortario vitreo donec mercurius abiit in mucum; adde insuper conterendo.

Syrupi cichorei c. rheo. ℥jβ.

m. d. u. S. mane ac vesperi detur infantibus cochleare parvum ligneum, dosis sensim augeatur.

Usus. Infantibus venereis hicce syrupus commodissime adhibetur.

### 4. Pilulae purgantes ordinariae.

℞. Massae pilularum Ruffi. ℥β.

resinae jalapae.

aquilae albae āā gr. iv.

m. f. pil. gr. iij. S. assumantur pro una dosi.

❧ 3 ❧ Usus.

**Usus.** *His pilulis omni decimo die alvum movea illis, qui mercurio utuntur: hae pilulae septies vel saepius alvum facile et certo movent, millenis aegrotis praescripte hypercatharsin non causerunt.*

5. *Decoctum altheae.*

**R.** Radicis altheae ℥ij.

Fol. malvae.

Flor. papav. rhoeados āā Mß.

coque in s. q. aquae per horae quadrantem, detur col. ℥ij.

**S.** Omni bihorio cum syrupo diacodii vel saccharo hauriantur vascula duo.

**Usus.** *In gonorrhoeae et aliorum morborum stadio inflammatorio conducit.*

6. *Pulvis eccoproticus ad gonorrhoeam.*

**R.** Rhei electi.

Salis mirabilis

Cremeris tartari āā ℥iij.

**m.** f. pulv. dividatur in xii doses aequales. **S.** omni trihorio de die assumatur unus.

**Usus.**

Usus. *Compeſcit urethrae ardorem et pus gonorrhoeicum intra aliquot ſeptimanas reddit lymphaticum.*

7. *Electuarium balsamicum ad gonorrhoeam.*

R. Rhei electi.

Salia mirabilis.

Cremoris tartari aa ʒiij.

Balsami copaiyae cum ſaccharo bene ſubacti. ʒβ.

Electuarii lenitivi. q. ſ.

m. ſ. elect. S. quater de die aſſumatur drachma ſemis.

Usus. *Ceſſante urinae ardore ac effluvio jam lymphatico exiſtente, morbum brevi curat, ſi non nimis magna adeſt laxitas urethrae.*

8. *Electuarium roborans ad gonorrhoeam.*

R. Cort. Winterani

— peruviani aa ʒiij.

— aurant.

— cinamomi.

Extract. martis pomati aa ʒij.

Syrup cort. aurantiorum. q. ſ.

m. ſ. electuar. S. quater de die aſſumatur drachma una.



Usus. In leucorrhæa et in lymphatico gonorrhæae stadio, si morbus incipiat chronicus fieri ac aegrotum emaciet, conducit.

### 9. Vinum roborans.

R. Limaturæ martis non rubiginos.

Cort. peruviani.

— cinamomi.

— Winterani aa ʒβ.

m. f. pulv. cui affunde vini generosi austriaci ℥ij, relinque in leni digestionem per 24 horas, dein colaturam per inclinationem exhibe.

m. S. detur ter de die cochleare unum, sensim augendo dosim.

Usus est ut electuarii roborantis, nempe gonorrhæam ac fluxum album, non amplius venereum, curat.

### 10. Decoctum ligni guajaci.

R. Rasuræ ligni guajaci. ʒij.

Coq. in aquae font. ℥iiss.

ad remanent. ℥ij.

m. d. S. hauriantur quotidie ℥ij.

Usus.

USUS. *Ante mercurii usum in lue venerea inventum, unicum in hoc morbo majoribus nostris fuit remedium. Convenit subiectis phlegmaticis. Sunt qui addunt decocto huic argenti vivi et antimonii crudi in sacculo singulum ligati ℥β et vocant decoctum ligni guajacæ compositum.*

II. *Decoctum lignorum antimoniale.*

R. Rad. sarsaparillae.

Santali albi et rubri āā ℥iij.

Rad. glycyrrh.

Cort. mezeræi āā ℥β.

Ligni rhodii

— guajaci

— saffrafas āā ℥j.

Antimonii crudi ℥ij.

m. et infund. cum aqua font. ebull. ℥x. per horas 24. dein coqu. ad ℥v. Collaturae capiat aeger ℥iβ sensim augendo dosim ad ℥v.

USUS. *Hoc decoctum Lisbonae inter medicos familiare est quō morbos post ptyalismum et usum mercurii liberaliorem residuos tollunt. Vid. Ill. MURRAY apparatus medicament. vol. I. p. 338.*

12. *Decoctum sarsaparillae.*

℞. Radicis Sarsaparillae ℥iij  
Coq. in aquae font. ℥iijß ad  
remanentiam ℥ij.

d. S. Hauriantur quotidie librae duae.

Usus. Optimum diluens et mundificans in lue venerea est. Convenit praecipue subiectis calidis, sanguineis.

13. *Decoctum sarsaparillae compositum.*

℞. Radic. sarsaparillae ℥ij.  
Cort. mezerai ℥ß.

Coq. in aquae fontanae ℥iij ad remanentiam unc. xxx. adde solutionis aquosae sublimati ℥j.

m. d. S. Hauriantur quotidie per 30 dies ℥ij.

Usus in lue inveterata cutis ac ossium magni usus esse laudatur. V. Samml. zum Gebrauch practischer Aerzte, 2. St. 85. S.

14. *Decoctum corticis mezeræi.*

℞. Corticis e radice mezeræi recentis ℥β  
 Coquatur in aquae fontanae ℥vj.  
 ad remanentiam ℥iv.  
 Sub finem adde radicis liquiritiæ ℥j.  
 Collatura detur. S. Hujus decocti. ℥β  
 bibat aeger quater in die.


Usus. *Laudatur in tophis, nodis venereis, doloribus osteocopis nocturnis, ac tumoribus venereis articulationum.*

15. *Decoctum stipitum dulcamarae.*

℞. Stipitum dulcamarae recent. ℥β  
 Aquae fontanae ℥xvj.

Coquantur ad uncias xi. S. ter de die bibantur eum lacte ℥iij.

Usus *in exostosi, herpete, arthritide venerea valde laudatur. V Journal de Médecine, T. 22. p. 236.*





## FORMULAE EXTERNAE.

### 19. *Solutio mercurialis simplex.*

R. **M**ERCURII dulcis ℥j.  
 Mucilaginis gummi arabici ℥j.  
 Aquae rosarum ℥j.

Solvantur conterendo exacte in mortario vitreo  
 vel marmoreo.

USUS. *Inseruit haec solutio pro injectione in gonorrhoea et fluore albo. In ipsa ophthalmia gonorrhoeica hac solutione oculos elui curabam. Cum mellis ℥j. mixta ulceribus loco aquae vulnerariae ac faucibus ulcerosis forma gargarismatis applicatur. Bubones, topi, phinosis, ac alii tumores veneri forma fomenti hac solutione tegantur.*

20. *Solutio mercurialis balsamica.*

℞. Tincturae myrrhae ℥β.

Laud. liquid. Sydh.

Decocti cort. peruviani āā ℥j.

Aquilae albae ℥ij.

*Alte. m. u. mit*

misce conterendo.

USUS. *Sordida, inveterata, cancrefcentia et cariosa ulcera venerea sanat, si fauces talibus afficiantur ulceribus, tunc haec ope penicilli bis vel ter de die hac solutione tangantur.*

21. *Aqua caustica pro condylomatibus.*

℞. Spiritus vini rectificati.

Aceti destilati āā ℥jβ.

Mercurii subl. corros. ℥j.

Aluminis crudi

Camphorae

Cerussae. āā ℥β.

Laudani liquidi ℥j.

m. solv. d. u.

USUS. *Condylomata ope penicilli hac aqua bis de die illiniantur et dein linimento mercuriali tegantur, Condylomata sic brevi ac sensum eva-*

evanescent ; cutis sana, condylomatibus intermedia, ab hac aqua non exulceratur.

## 22. Lac mercuriale.

R. Mercurii vivi, depuratissimi ℥j.

Gummi arabici pulverisat. ℥β.

Syrupi diacodii q. f.

m. conterantur in mortario marmoreo sensim addendo syrupum donec omnia abeant in mucum, cui sensim adde

lactis ebullientis vaccini ℥viij.

m. d. usui.

Usus. In ophthalmia gonorrhoeica ope vasculi balneatorii et in phymosi venerea, forma peniluvii applicetur. Idem lac in angina venerea dolorosa sub forma gargarismatis optimo cum successu adhibetur.

## 23. Balsamus mercurialis.

R. Vnguenti basiliconis ℥jβ.

Mercurii praecipitati rubri. ℥ij.

misceantur exactissime.

Usus.

Usus. *Ad ulcera venerea consolidanda ad tophos aut scirrhos venereos resolvendos, adhibetur. Eodem cum effectu loco mercurii praecipitati rubri, mercurium dulcem, vel mercurium praecipitatum album cum balsamo quodam mixtum adhibui.*

21. *Balsamus ophtalmicus ruber.*

R. Butyri recentis insulsi. ℥iij.  
Cerae albae ℥β liquefactis adde  
Mercurii praecipitati rucri ℥ijβ.  
Tutiae praeparatae ℥j.  
Camphorae in oleo ovorum ℥β. solutae gr. XLV.

m. f. unguent. S. ter de die lentis magnitudo illiniatur oculo.

Usus. *Corneae maculas, ulcera et obscuraciones, nec non lippitudinem ac reliquos oculorum morbos venereos, chronicos, egregie curat.*

22. *Unguentum resolvens ad bubones*

R. Vnguenti de arthanita  
— neapolitani. āā ℥j.

Pulv.



Pulv. rad. mandragorae.  $\text{℥j}\beta$ .  
Mellis communis. q. f.

m. f. lenimentum.

Usus. *Ad bubones induratos resolvers laudatur.  
Inungatur bubo mane ac vesperi et dein ter-  
gatur hocce unguento.*



Exempl. des Vfsentwurfes nach der  
Professors Thomanns Methode

Zur Anfangs beandte man ihn einige Tage  
bloß innerlich Lufte

R Calomel grß

Sach. a. Zi

m. f. pulv. d. p. dos. d. tal. dos. d.

1/2 Löffel in Abend Lufte

R Caru. arenas. Zij

Stip. Suleam.

r. alth. ca Zij

m. f. zum Gebrauch.

Subij einige man die Cyfbenüre mit Ag.

Cale. Zij 3, dann nehmen man ein

Sublimat. Auflöfung zum Waschen der

Cyfbenüre d. die Bubonen, wenn sie

aufgegangen einige a mit einem kleinen

Pinz. - Lsg. Ung. Basilic. damit, und etwas



Siehe das Engl. Matrig, dann sind  
Compressen. Ist die Wunde ziemlich mit  
geteilt: so verbindet sie trocken, und  
legt über den Verband mit Goulard  
Thieras angestrichene Compressen,  
die der Bubo zugefügt ist.

Auf Goulardgeffächelte leg. Cataplasma  
von V<sup>e</sup> Goul. mit Markbrodhanen;  
die Brodhanen binden das V Goul. und  
sind so, daß es nicht so leicht wieder  
brechen werde.

Will Salivation ein; so setze die Mercur.  
mittel auf, und gebe Opium bis die  
Alumina Salivationis nach lassen; dann  
setzen mit dem Mercur. fort, bis zur voll  
Genesung.

137. "Venereal Tuber" Schwindbeutel-  
consumption

PC  
200. A2  
P72  
1787



